

신신복합UDCA

유디씨에이 연질캡슐

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

[유효성분]	1캡슐(1,244mg) 중
우르소데옥시콜산(KP)	25.0mg
이노시톨(KP)	10.0mg
인삼30%에탄올건조엑스(생규)(진세노사이드 Rb1(으)로서 0.67 밀리그램)	50.0mg
타우린(KP)	300.0mg
티아민질산염(KP)	5.0mg

[효능 · 효과] 육체피로 개선, 자양강장, 병중·병후의 비타민 B1 보급

[용법 · 용량] 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1캡슐(정), 1일 2회 복용한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조번호], [사용기한] (연. 월. 일. 까지) 별도표기

[성상] 갈색의 내용물이 든 암적색의 장방형 연질캡슐

[포장단위] 1캡슐/포, 100캡슐/상자(1캡슐/포x100)

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분에 과민반응 환자 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 구역, 구토, 묽은 변, 발진, 하리(설사) 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 3) 복용 시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용한다. 4) 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 월경지질치를 점검 할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다. 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[첨가제]

- 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호
- 첨가제(동물유래성분): 숙산산젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 소의 가죽)
- 기타첨가제: 농글리세린, 레시틴, 백랍, 산화티탄, 소르비톨 액(비결정성), 에틸바닐린, 중쇄트리글리세리드, 카르나우바납, 콩기름, 팜유

[제조자] (주)서흥, 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

[제조외뢰자] 신신제약(주), 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

소비자상담실 : 02) 2030-1745 www.sinsin.com

[첨부분서 작성일자] 2020년 11월 11일

- ★ 본 제품의 자세한 허가사항은 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ★ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ★ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)