



베아파모[®]정 10mg

(파모티딘)

일반의약품
조 제 용

위산과다, 속쓰림, 신트림 치료제

사용전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오. 사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

- 유효성분 : 파모티딘(KP) 10mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭실드녹색(59G392)

【성 상】 연녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 신트림

【용법·용량】 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
- 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
- 헉기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
- 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
- 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
- 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
- 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고는 있는 경우
- 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
- 신장장애(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있습니다)
- 심질환 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있습니다)
- 간장애 환자(증상이 악화될 수 있습니다)
- 고령자(노인)
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.)
- 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있습니다.)
- 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무조치로제(이 약의 위산분비 억제작용이 아즐게 항진균(곰팡이)약(예, 이트라코나졸)의 경우 흡수를 저하시킵니다.)
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 증상이 지속되거나 악화되는 경우
- 이 약은 14일 이상 복용하지 않습니다.
- 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의합니다.
 - 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등
 - 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신권태감, 무력, 피하(피부 밑)점막하 출혈, 발열)
 - 피부 : 피부점막인증후군, 포피괴사증, 발진, 두드러기(홍반)
 - 간 : 간기능 이상, AST(GOT) · ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈 · LDH 상승, 황달, 간염
 - 근골격계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육경련
 - 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면홍조, 이명(귀울림)
 - 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신권태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
 - 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
 - 비뇨생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN · 크레아티닌 상승 등), 월경불순
 - 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련
 - 기타 : 여성형유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용합니다.
- 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 합니다.
- 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담합니다.
- 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있습니다.
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 200정/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

제조의뢰자 : 대웅바이오(주) / 경기도 안성시 공단1로 69
제 조 자 : 한국코러스(주) / 충청북도 제천시 강제로 30

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 정상적인 의약품 사용에도 불구하고 의약품 부작용으로 인하여 사망, 장애, 질병 등 피해를 입은 환자분께서는 부작용 피해구제 신청을 [한국약품안전관리원\(1644-6223\)](http://www.kafca.go.kr)에 할 수 있습니다.



작성 연월일 : 2020. 05. 21
최종 개정 연월일 : 2020. 12. 08

- ※ 이 첨부문서 개정 연월일 후 변경된 내용은 대웅바이오 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 대웅바이오 홈페이지(www.daewoongbio.co.kr) / 소비자 상담 전화번호(080-789-0787)