

리피엑스캡슐 60mg / 리피엑스캡슐 120mg

(오르리스타트)

014503-001

[원료약품 및 구분량]

리피엑스캡슐60밀리그램(오르리스타트)

- 유효성분: 오르리스타트(USP):..... 60mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 카프릴로카프로일 폴리옥시글리세라이드, 캡슐, 크로스 포비돈, 탭크, 히드록시프로필셀룰로오스

리피엑스캡슐120밀리그램(오르리스타트)

- 유효성분: 오르리스타트(USP):..... 120mg
- 첨가제(타르색소): 적색40호, 황색1호
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 카프릴로카프로일 폴리옥시글리세라이드, 캡슐, 크로스 포비돈, 탭크, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

리피엑스캡슐60밀리그램(오르리스타트)

백색 또는 마백색의 분말 또는 과립이 든 상, 하부 노란색의 경질캡슐제

리피엑스캡슐120밀리그램(오르리스타트)

백색 또는 마백색의 분말 또는 과립이 든 상, 하부 청록색의 경질캡슐제

[효능·효과]

체질량지수(BMI) 30kg/m² 이상 또는 다른 위험인자(예, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증)가 있는 27kg/m² 이상의 비만환자에 있어 저칼로리 식이와 함께 체중감소 또는 체중유지를 포함한 비만치료 또는 체중 재증가의 위험감소

[용법·용량]

- 성인
 - 1) 약의 권장 용량은 지방을 함유하는 식사와 함께 복용하거나 식사 후 1시간 이내에 오르리스타트로서 1회 120mg, 1일 3회 경구투여한다.
 - 환자들은 지방에 의한 열량이 약 30%인 영양학적으로 균형 잡힌 가벼운 저칼로리 식사를 계속해야 한다. 지방, 탄수화물 및 단백질의 1일 섭취량을 세끼 식사에 골고루 분배하여 섭취해야 한다. 식사를 거르거나 지방이 함유되지 않은 식사를 하는 경우에는 이 약을 복용하지 않을 수 있다.
 - 이 약에 의해 몇몇 지용성 비타민 및 베타카로틴의 흡수가 감소될 수 있으므로, 환자들은 적절한 영양섭취를 위하여 지용성 비타민이 들어있는 종합비타민을 복용하는 것이 권장된다. 비타민 보충제는 이 약 투여 최소 2시간 전 또는 취침 시와 같이 이 약 투여 최소 2시간 후에 복용해야 한다.
 - 이 약으로서 1회 120mg, 1일 3회 초과 복용이 효과를 증가시키지는 않는다.
 - 분변 중 지방 측정결과에 의하면 이 약의 효과는 약물 복용 24~48시간 후에 나타난다. 치료를 중단하면 분변 중 지방함량은 대개 48~72시간 이내에 치료 전 수준으로 환원된다.
 - 4년을 초과하는 기간에 대한 이 약의 유효성 및 안전성 평가는 이루어지지 않았다.
 - 간장애 및/또는 신장애 환자, 12세 미만의 소아 및 고령자에 대한 연구는 진행되지 않았다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 만성 흡수 불량 증후군 환자 또는 담즙불분지성 환자
 - 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 다음 환자(경우)에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 간 손상: 이 약을 복용한 환자에서 드물게 간 손상이 보고되었다. 간 기능 이상의 징후가 나타날 경우 의사에게 보고하고, 이 약을 비롯한 의식 의약품 사용을 즉시 중단한다. 간 기능 검사를 실시해 ALT 및 AST 수치를 확인해야 한다(일반적 주의)와 항 치료).
 - 2) 고수산노증 또는 수산칼슘 신결석력이 있는 환자(요중 수산염 배설이 증가될 수 있다)
- 이상반응
 - 1) 자주 관찰되는 이상반응(이 약 120mg 또는 약물을 1일 3회씩 1년 또는 2년간 투여한 자료에 근거함): 위약을 대조로 한 이 약의 이중맹검 임상시험에서 가장 자주 관찰된 이상반응은 소화기에 중상이었으며, 이는 근본적으로 작용기전을 입증하는 것이(자주 관찰되는 이상반응이란 발현빈도가 5%이상인 경우를 의미하며, 이 약 120mg 투여군에서의 발현 빈도는 위약의 최소한 2배 이상이었다).

이상반응	1년차		2년차	
	약물 투여군* 환자% (n=1,913)	위약 투여군* 환자% (n=1,466)	약물 투여군* 환자% (n=613)	위약 투여군* 환자% (n=524)
유상변절변	26.6	1.3	4.4	0.2
복부팽만 및 뱀귀	23.9	1.4	2.1	0.2
변의 빈삭	22.1	6.7	2.8	1.7
지방 / 유상분변	20.0	2.9	5.5	0.6
유상배변	11.9	0.8	2.3	0.2
배변증가	10.8	4.1	2.6	0.8
배변실금	7.7	0.9	1.8	0.2

- * 치료란 이 약 120mg, 1일 3회 + 식이 또는 위약 + 식이를 의미한다.
- 이들 이상반응 및 다른 자주 관찰되는 이상반응들은 일반적으로 경미하고 일시적이었으며, 2년차 치료 중에 감소되었다. 이들 이상반응은 이들 이상반응은 치료 시작 후 3개월 이내에 처음 나타났다. 전반적으로, 이 약 치료와 관련된 약 50%의 소화기계 이상반응들의 지속기간은 1주 이내였으며, 대부분 지속기간은 4주 이내이었다. 그러나 환자에 따라 소화기계 이상반응이 6개월 또는 그 이상 지속될 수 있다.
- 2) 치료중단: 임상시험에서 이 약 투여군의 8.8%가 이상반응 때문에 투여를 중단하였던 반면, 위약 투여군은 5.0%가 중단하였다. 이 약 투여군에서 치료를 중단하게 되는 가장 흔한 원인은 소화기에 이상반응이었다.
- 3) 임상시험 중 이상반응 발현율: 다음 표에는 7개 다기관에서 실시된 위약 대조 이중맹검 임상시험에서 이 약 120mg, 1일 3회 투여 환자군에서 2%이상의 빈도로 나타났던 치료관련 이상반응과, 연구약물과의 관련성과 관계없이 1년차 및 2년차 동안 위약 투여군에서 보다 발현빈도가 높았던 이상반응들을 나열하였다.

기관계 / 이상반응	1년차		2년차	
	약물 투여군* 환자% (n=1,913)	위약 투여군* 환자% (n=1,466)	약물 투여군* 환자% (n=613)	위약 투여군* 환자% (n=524)
소화기계				
복통 / 불쾌감	25.5	21.4	-	-
구역	8.1	7.3	3.6	2.7
감염성 설사	5.3	4.4	-	-
직장통 / 불쾌감	5.2	4.0	3.3	1.9
치아	4.3	3.1	2.9	2.3
치은	4.1	2.9	2.0	1.5
비타민E		0.0%		0.0%
베타카로틴		0.8%		1.5%

- *연구기간동안 모든 환자들은 비타민 보충제를 투여받았다.
- ** 위약 + 식이 또는 오르리스타트 + 식이로 치료
- 6) 시판 후 이 약을 복용한 환자에서서 간세포 괴사나 급성 간변과 같은 중증의 간 손상이 드물게 보고되었다. 이 중 일부는 간 이식이나 사망으로 이어졌다. 환자에게 이 약을 복용하는 동안 간 기능 이상의 징후(식욕감퇴, 가려움, 황달, 어두운 색 소변, 연한색 대변, 상복부 우측 통증)가 나타날 경우 의사에게 보고하도록 지시해야 한다. 이러한 징후가 나타날 경우 이 약을 비롯한 의식 의약품 사용을 즉시 중단하고 간 기능 검사를 실시해 ALT 및 AST 수치를 확인해야 한다.
- 7) 임상연구 결과에 의하면 이 약에 의한 체중 감소로 인하여 당뇨병 환자의 대사조절이 개선될 수도 있으며, 그 결과 경구용 저혈당약(예, 설폰부릴아제 약물, 메트 포르민)이나 인슐린 투여량 감소가 요구될 수도 있다.
- 8) 과도한 체중 감소는 담석증의 위험을 증가시킬 수 있다. 제2형 당뇨병의 예방에 대한 임상시험에서 담석증 발생율은 이 약 투여군에서 2.9%(47/1,649), 위약군에서 1.8%(30/1,655)로 나타났다. 본 임상시험에서 이 약 투여군과 위약군의 체중감량 정도가 유사한 경우, 담석증 발생빈도는 유사하였다. 제2형 당뇨병 예방을 하지 않은 임상시험에서는 이 약으로 인한 담석증 증가가 나타나지 않았다.
- 9) 잘못 사용할 가능성: 다른 체중감소 약물에서와 마찬가지로 부적절한 환자군(예, 신장성 식욕불량 또는 탐식)이 이 약을 오용할 가능성이 있다(권장 처방지침으로서 효능·효과항 참고할 것).
- 10) 경구 항응고제와 병용하는 환자는 INR 수치와 같은 혈액 응고계수의 변화를 모니터링해야 한다.

- 상호작용
 - 1) 알코올: 정상체중인 30세를 대상으로 이 약 및 알코올 40 g(예, 포도주 약 3잔)을 병용 반복투여시 알코올의 약물동력학, 이 약의 약력학(분변 중 지방배설 또는 이 약의 전신 노출에 변화는 나타나지 않았다).
 - 2) 시클로스포린: 이 약을 시클로스포린과 동시에 투여하였을 때 시클로스포린의 혈장 농도가 감소하였다. 따라서 이 약과 시클로스포린을 동시에 투여해서는 안된다. 약물 상호작용 가능성을 줄이기 위해 두 약물을 모두 복용하는 경우에는 이 약을 투여하고 최소 3시간 전후에 시클로스포린을 복용해야 한다. 그리고 시클로스포린의 농도를 측정 중인 환자에서는 측정 횟수를 더 늘려야 한다.
 - 3) 디곡신: 이 약 120mg 1일 3회, 6일간 투여한 정상체중인 12례에서, 이 약은 디곡신 단독 투여시의 약물동력학에 영향을 미치지 않았다.
 - 4) 지용성 비타민 보충제 및 유도제: 약물동력학 상호작용 연구에서, 이 약과 베타카로틴 보충제 동시투여시 베타카로틴 흡수가 30% 감소되었다. 이 약은 또한 소산 비타민E 보충제의 흡수를 약 60% 저해하였다. 이 연구에서 이 약이 베타민D 보충제, 비타민A 보충제 및 영양학적으로 유도된 비타민의 흡수에 미치는 영향은 알려지지 않았다.
 - 5) 글리부리드: 이 약 80mg, 1일 3회 5일간 투여한 정상체중인 12례에서 이 약은 글리부리드의 약물동력학 또는 약력학(혈당저하)을 변화시키지 않았다.
 - 6) 니페디핀(서양정): 이 약 120mg, 1일 3회 6일간 투여중인 정상체중인 17례에서 이 약은 니페디핀(서양정)의 생체이용률을 변화시키지 않았다.
 - 7) 경구피임제: 이 약 120mg 1일 3회 23일간 투여한 정상체중 여성 20례에서 경구피임제의 배란억제 작용은 변화되지 않았다.
 - 8) 페니토인: 이 약 120mg, 1일 3회 7일간 투여한 12례의 정상체중인에서 이 약은 페니토인 300mg 단독투여시의 약물동력학을 변화시키지 않았다.
 - 9) 프라바스타틴: 이 약 120mg 1일 3회 6일간 투여한 경미한 고콜레스테롤혈증 정상 체중인 24례에서 이 약은 프라바스타틴의 약물동력학에 영향을 미치지 않았다.
 - 10)와르파린 및 경구 항응고제: 건강한 성인 12례를 대상으로 이 약 120mg, 1일 3회 16일간 투여시 와르파린의 약물동력학(R- 및 S-광학이성체 모두) 또는 약력학(프로트롬빈 시간 및 혈청인자 VII)에 아무런 변화도 없었다. 비타민K의 영양상태 표식자인 카르복실화가 불충분한 오스테오칼신은 이 약에 투여에 의해 변화되지 않았으나, 혈중 비타민K 농도는 감소경향을 보였다. 따라서 이 약에 의해 비타민K 흡수가 감소될 수 있으므로, 안정된 용량의 와르파린을 장기간 복용 중인 환자로서 이 약을 처방받은 환자는 혈액응고 계수의 변화를 면밀히 모니터링하여야 한다. 경구 항응고제와 병용하는 환자는 지혈 변수의 변화를 초래하는 프로트롬빈수치감소, INR 상승 및 불안정한 항응고제 치료효과가 이 약과 항응고제를 병용투여한 환자에서 보고되었으므로 혈액응고계수의 변화를 모니터링해야 한다.
 - 11)아미오다론: 약물동력학시험에서, 오르리스타트 투여중에 아미오다론의 경구투여시 아미오다론 및 desethyl-아미오다론 전신 노출이 25~30% 감소되었다. 아미오다론의 복잡한 약물동력학적 특성으로 이러한 현상의 임상적 효과는 불분명하다. 안정적인 아미오다론 요법을 받고 있는 환자에서 이 약 투여의 효과는 연구되지 않았으나 아미오다론의 효과감소될 가능성이 있다.
 - 12)이 약과 항간질제를 병용한 환자에서 경련이 보고되었다. 인과관계는 확립되지 않았으나, 환자의 경련 발생빈도 및/또는 경증도의 변화를 모니터링해야 한다.
 - 13)이 약과 아카보즈의 병용투여는 피하여야 한다.
 - 14)오르리스타트 치료 시작과 동시에 이전에 조절이 되었던 환자(well-controlled patients)에서 항우울제, 항정신병제(리튬 포함), 변조디아제핀계 약물의 효과가 감소되는 몇 가지 사례가 보고되었다. 그러므로 이러한 환자에 발생할 수 있는 영향을 신중히 고려하여 오르리스타트 치료를 시작해야한다.
 - 15)atazanavir, ritonavir, tenofovir disoproxil fumarate, emtricitabine, lopinavir/ritonavir 및 emtricitabine/efavirenz/tenofovir disoproxil fumarate와 같은 항레트로바이러스 치료제를 이 약과 병용 투여한 HIV 감염 환자에서 바이러스 조절의 상실이 보고되었다. 이와 관련된 정확한 기전은 명확하지 않지만, 약물 상호작용에 의해 항레트로바이러스 치료제의 전신 흡수가 억제 될 수 있다. HIV 감염을 치료 받는 동안 이 약을 복용하는 환자는 HIV RNA 수치를 자주 모니터링 해야 한다. HIV 바이러스 상성이 확인된 경우에는 이 약을 중단해야 한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 400 mg/kg/일 용량을 랫드에 투여한 수태는 및 일반생식독성실험에서 이 약에 의한 이상반응은 관찰되지 않았다. 이 용량은 랫드의 체표면적(mg/m²)을 기초로 계산시 사람 1일 용량의 12배량이다.
 - 2) 랫드 및 토끼를 대상으로 800mg/kg/일까지의 용량을 투여하여 기형발생 실험을 실시하였다. 두 동물 모두에서 배자 독성이나 태자 독성은 나타나지 않았다. 이 용량은 랫드 및 마우스의 체표면적(mg/m²)을 기초로 계산시 사람 용량의 각각 23 및 47배량이다.
 - 3) 임부를 대상으로 한 적절한하고도 잘 관리된 이 약의 임상시험 결과는 없다. 그러나 임부의 체중 감소는 임부에게 잠재적 유용성을 제공하지 않고 태아에게 해를 입힐 수 있다. 동물에서의 생식독성 실험결과에 의해 항상 사람에서의 반응을 예측할 수 없으므로 임신중 이 약의 사용은 권장되지 않는다.
 - 4) 이 약이 모유로 이행되는 지는 알려지지 않았으므로, 이 약을 수유부에게 투여해서는 안된다.
- 소아에 대한 투여
 - 1) 이 약의 소아에 대한 유효성 및 안전성은 12 ~ 16세의 비만청소년을 대상으로 평가되었으며, 이 연령그룹에 대한 이 약의 사용은 12 ~ 16세 비만청소년에 대해 1회 120mg, 1일 3회 투여로 54주간 실시한 효능 및 안전성 연구와 21일간의 무기질 균형 연구 및 성인에 대한 연구 데이터에 의해 뒷받침 되었다. BMI는 이 약 치료군에서 0.55 kg/m² 및 위약 치료군에서 0.31 kg/m² 감소하였다(p=0.001).
 - 이상반응은 성인에서 나타난 것과 유사하며, 지방/유상분변, 유상변절변, 유상배변 등을 포함한다. 54주 연구에서 오르리스타트군 중 152명의 환자와 위약군 중 77명의 환자에 대해 DEXA 로 측정된 체조성 변화는 위약군과 비교시 이 약 치료군에서 상당한 감소를 나타낸 지방질량(-2.5kg 대 -0.6kg, p=0.033)을 제외하고는 두 군이 유사했다. 이 약은 지용성비타민의 흡수를 방해하기 때문에, 모든 환자들은 비타민A, D, E, K, 베타카로틴을 포함한 종합비타민 보충제를 매일, 이 약 투여 최소 2시간 전후에 복용해야 한다.
 - 이 약은 12세 미만의 소아에 대해서는 연구되지 않았다.
- 고령자에 대한 투여
 - 1) 약은 고령자에 대한 효과를 판정할 만한 충분한 임상시험을 실시하지 않았다.
- 과량투여시의 처치
 - 1) 정상체중인 및 비만인을 대상으로 15일간 이 약 800 mg 1회 또는 400mg, 1일 3회 투여시 유의성있는 이상반응은 야기되지 않았다. 또한 6개월간 비만인을 대상으로 240 mg을 1일 3회 투여시에도 임상적으로 유의한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았다.
 - 2) 시판 후 조사에서 보고된 오르리스타트 과량투여 환자에서도 이상반응이 발생되지 않거나 권장용량 투여군에서 보고된 것과 유사한 이상반응이 보고되었다.
 - 3) 이 약을 상당량 과량투여했을 경우에는 환자를 24시간동안 관찰해야 한다. 사람 및 동물실험 결과에 의하면, 이 약의 지방분해효소 저해 작용에 기인한 전신효과는 빠르게 가역적으로 회복된다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하도록 주의한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.
 - 3) 빛과 습기로부터 보호하기 위해 블리스터 포장에 차광하여 보관한다.
- 임상시험 정보
 - 가. 시험약 올리엡엑스120밀리그램(오르리스타트)(알보켄코리아(주))과 대조약 제니칼캡슐120밀리그램(오르리스타트)(㈜종근당)을 체질량지수(BMI) 30kg/m²이상이거나, 체질량지수(BMI) 27-30kg/m² 미만서 다른 위험인자(고혈압 또는

	3.8	3.5	-	-
호흡기계				
인플루엔자	39.7	36.2	-	-
상부 호흡기계 감염증	38.1	32.8	26.1	25.8
하부 호흡기계 감염증	7.8	6.6	-	-
이비인후과 증상	2.0	1.6	-	-
근골격계				
배우통	13.9	12.1	-	-
하지통	-	-	10.8	10.3
관절염	5.4	4.8	-	-
근육통	4.2	3.3	-	-
관절	2.3	2.2	-	-
힘줄염	-	-	2.0	1.9
중추신경계				
두통	30.6	27.6	-	-
수면장애	5.2	5.0	-	-
전신				
피로	7.2	6.4	3.1	1.7
수면장애	3.9	3.3	-	-
피부 및 부속기계				
발진	4.3	4.0	-	-
피부건조	2.1	1.4	-	-
여성생식기계				
월경불순	9.8	7.5	-	-
질염	3.8	3.6	2.6	1.9
비뇨기계				
요로감염증	7.5	7.3	5.9	4.8
정신신경계				
정신불안	4.7	2.9	2.8	2.1
우울	-	-	3.4	2.5
귀				
이명	4.3	3.4	2.9	2.5
심혈관계				
발부종	-	-	2.8	1.9

- * 치료란 이 약 120mg, 1일 3회 + 식이, 또는 위약 + 식이를 의미한다.
- 발생빈도가 2%이상 또는 위약보다 큰 것으로 보고되지 않은 경우
- 4) 4년간의 임상시험에서 이상반응의 일반적인 양상은 1년 및 2년간 시험에서 보고된 것과 비슷했으며, 위장관 관련 이상 반응의 총 발생률은 4년 동안 첫째에 비해 매년 감소했다.
- 5) 기타 임상 연구 또는 시판 후 연구
- (1) 드물게 아미노전달효소와 ALP 상승, 그리고 심각한 결과를 초래할 수 있는 간염이 보고되었다. 시판 후 연구에서 이 약 사용 시 간부전이 보고되었으며, 이중 일부의 사례는 간이식 또는 사망으로 이어졌다.
- (2) 드물게 과민반응이 보고된 바 있다. 증상과 징후에는 가려움, 발진, 두드러기, 혈관부종, 기관지연축 그리고 아나필락시스가 있다. 매우 드물게 수포성 발진이 보고되었다.
- (3) 지혈 변수의 변화를 초래하는 프로트롬빈수치감소, INR 상승 및 불안정한 항응고제 치료 효과가 이 약과 항응고제를 병용투여한 환자에서 보고되었다.
- (4) 이 약과 레보티록신을 병용 투여한 환자에서 갑상샘기능저하증이 보고되었다.
- (5) 폐장염이 시판 후 연구에서 보고되었다. 폐장염과 비만치료와의 인과관계 또는 병태생리학적 기전은 확립되지 않았다.
- (6) 비만인 당뇨병 환자를 대상으로 한 임상에서 저혈당증 및 복부팽만이 보고되었다.
- (7) 이 약과 항간질제를 병용한 환자에서 경련이 보고되었다.
- (8) 이 약과 시클로스포린을 동시에 투여하면 시클로스포린의 혈장 농도가 저하되는 것으로 나타났다(상호작용항 참고).
- (9) 이 약을 사용한 환자들에게서 하부 위장관 출혈이 보고되었다. 대부분 심각하지 않은 사례였으며, 심각하거나 중상이 지속되는 사례에 대해서는 추가적인 조사가 필요하다.
- (10) 고수산노증 및 수산염 신증이 보고되었다.
- 6) 국내 시판 후 조사결과: 국내에서 재심사를 위하여 793명을 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 이상반응은 30.4%(241명/793명)가 보고되었고, 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 29.9%(237명)였다. 자주 관찰되는 이상반응은 소화기계 중상으로 29.0%(230명)이었으며 일반적인 양상은 1년 및 2년간 임상시험에서 보고된 것과 비슷하였다. 이중 시판 전 임상에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로 피부감각이상 1명, 2번 2회, 소화불량/쓰쓰림 2명이 보고되었다.

- 일반적 주의
 - 1) 기질적 비만원인(예, 갑상샘기능저하증)은 이 약의 처방 대상에서 제외되어야 한다.
 - 2) 식이조절을 준수하도록 환자에게 충고해야 한다(용법용량항 참고). 이 약은 고지방식(총 1일 섭취 칼로리중 지방 30% 이상)과 함께 복용시에는 소화기계 이상반응이 증가될 가능성이 있다. 1일 지방 섭취량은 세끼 식사에 골고루 분포되도록 하여야 한다. 이 약을 매우 많은 양의 지방함유 식사와 함께 복용하면 소화기계 이상반응이 증가할 수 있다.
 - 3) 이 약 투여에 의해 몇몇 지용성 비타민 및 베타카로틴 흡수가 감소될 수 있으므로, 적절한 영양 상태가 유지될 수 있도록 환자로 하여금 지용성 비타민 함유 종합 비타민 보충제를 복용하도록 권장해야 한다. 또한 비만 환자는 비비타민에 비하여 비타민D 및 베타카로틴 혈중농도가 낮을 수 있다. 비타민 보충제는 1일 1회 이 약 투여 최소 2시간 이전 또는 취침시와 같이 이 약 투여 최소 2시간 후에 복용해야 한다.
 - 4) 표 3에는 이 약도는 위약으로 1년 및 2년간 치료도중 비타민 보충제를 투여받지 않았던 성인 환자들로서 2회 또는 그 이상 연속 방문시 혈중 비타민 농도가 낮았던 환자들의 %가 소개되어 있다.

표 3. 2회 또는 그 이상 연속 방문시 저 혈중 비타민 농도 환자 빈도(임상개시시 정상치*인 소아 환자)

	위약*	약물*
비타민A	10.9%	2.2%
비타민D	6.6%	12.0%
비타민E	10.9%	5.8%
베타카로틴	17.7%	6.1%

* 위약 + 식이 또는 오르리스타트 + 식이로 치료

- 5) 표 4에는 이 약도는 위약으로 1년간 치료 도중 2회 또는 그 이상 연속 방문시 저혈중 비타민 농도가 낮았던 청소년 환자들의 %가 소개되어 있다.
- 표 4. 2회 또는 그 이상 연속 방문시 저혈중 비타민 농도 환자 빈도
- (임상개시시 정상치*인 소아 환자)

	위약**	약물**
비타민A	0.0%	0.0%
비타민D	0.7%	1.4%

이상지질(혈중) 중 한가지 이상을 가지고 있는 비만 환자에게 무작위로 배정하고 식이요법과 병행하여 12주간 1일 3회 12캡슐씩 경구투여하여 0주 대비 투약 후 12주째 체질량지수(BMI)(kg/m²)와 체지방량을 측정한 결과 체질량지수(BMI) 변화량이 동등함을 입증하였다.

구분	비교평가항목	
	체질량지수(BMI) 변화량(kg/m ²)	
시험약	0.70±0.83	
대조약	0.78±0.98	
95% 신뢰구간(허용기준 : -0.55 ~ 0.55)	-0.40 ~ 0.23	

[체질량지수(BMI)변화량 : 평균값±표준편차]

나. 의약품 동등성시험기제 제7조제2항에 따라, 시험약 올리엡엑스60밀리그램(오르리스타트)(알보켄코리아(주))은 대조약 올리엡엑스120밀리그램(오르리스타트)(알보켄코리아(주))과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

주1. 이 약은 알보켄코리아(주) 올리엡엑스120밀리그램(오르리스타트) 및 올리엡엑스60밀리그램(오르리스타트)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 알보켄코리아(주)에 위탁 제조하였음.

- 기타
 - 1) 마우스 및 랫트를 대상으로 한 발암성 실험에서, 이 약을 각각 1,000 mg/kg/일 및 1,500 mg/kg/일 용량까지 투여시 발암성을 보이지 않았다. 마우스 및 랫드에 있어서 이들 용량은 총 약물관련 물질의 농도가 면적 대 시간(면적×시간)으로 계산된 시판 1일 용량의 38 및 46배에 해당한다.
 - 2) Ames 시험, 포유류의 배양세포를 이용하는 유전자 돌연변이 시험(V79/HPRT), 사람 말초 세포구를 이용한 시험관내 염색체 이상 유발시험, 배양중인 세포 간세포를 이용한 염색체이상 시험(UDS) 및 마우스 생식 조직에서 이 약의 변이원성이나 유전자 독성은 나타나지 않았다.

[포장당량] 300캡슐/병, 300캡슐/병

[저장방법] 기밀용, 빛과 습기를 피하여 25°C 이하 보관

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회신고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 소손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

- 제조의뢰자: **동국제약(주)** 충청북도 진천군 관혜원면 용소2길 33-19
- 제조자: **알보켄코리아(주)** 경기도 화성시 함남읍 제약공단2길 36

설명서 최종 개정 연월일: 2021.01.15

Dongkook

동국제약