

일반의약품

치은염(잇몸염), 치주(치아주위조직)염의 보조치료에

치스돌플러스정

Chisdol Plus Tab.

【성상】 주황색의 원형 필름코팅정

【원료약품 및 그 분량】 1정(422밀리그램) 중 유효성분

- 후박75%에탄올연조엑스(5→1)(별규) 70mg
- 옥수수불검화정량추출물(생규) 35mg
- 첨가제(타르색소) : 청색2호알루미늄레이크, 황색4호, 황색5호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스102, 스테아르산마그네슘, 오파그로스 2 클리어 (97W19196), 오파드라이 화이트 (03B28796), 오파드라이 200 오렌지 (200F630014), 콜로이드성아산화규소, 크로스폴비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

치주(치아주위조직)치료 후 치은염(잇몸염), 경·중등도 치주(치아주위조직)염의 보조치료

【용법·용량】

초기량 : 1회 2정 1일 3회 식전에 경구투여(복용한다) 유지량 : 1회 1정 1일 3회 식전에 경구투여(복용한다)

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 한다.
2) 이 약은 글루테스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의한다.
3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다)
4) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다(황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF) 함유제제에 한함).
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 가벼운 알러지작용을 일으킬 수 있다.
2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있다.
3) 국내에서 만성치주(치아주위조직)염 환자 55명을 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약과의 인과 관계에 상관없이 보고된 이상반응을 발현(드러냄)부위별로 분류하면 다음과 같다.

- 소화기계 : 소화불량, 과민성대장염 환자에서의 증상 악화, 구강(입안)궤양
- 간 및 담도(담관)계 : ALT 증가, 총 빌리루빈 증가
- 피부 및 부속기계 : 얼굴 및 목의 가려움
- 대사 및 영양계 : 얼굴부종(부기)
- 기타 : 청력이상, 잇몸통증
- 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 국내 임상시험결과 옥수수불검화정량추출물 단일제와 후박75%에탄올연조엑스를 함유한 복합제 간의 유의성 있는 유효성 차이는 없었다.
2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
3) 장기간 계속하여 복용하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 240정(120정x2)/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【설명서 개정연월일 / 관리번호】 2020.06.11 / P2006-01

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 최종 개정연월일(2020.06.11)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- ※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

【제조의뢰자】



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 : www.ilwang.co.kr

【제조사】



(주)마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18