

엑세라민프로정

— 고함량 코어 비타민 —

고함량 피로회복 비타민 B군 8종 함유 / 푸르셀티아민 100mg,
비타민B12 1,000 µg, 비타민D 1,000IU, 아연 50mg, 비오틴 500µg

원료약품 및 분량


(1정 중)

■ 유효성분 :

푸르셀티아민(KP)	100mg
리보플라빈(KP)	50mg
니코틴산아미드(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	150mg
피리독신염산염(KP)	50mg
폴산(KP)	0.4mg
시아노코발라민(KP)	1mg
비오틴(USP)	0.5mg
농축콜레칼시페롤(분말형)(EP)	10mg
(비타민D로서 1,000IU)	
산화마그네슘(KP)	82.92mg
(마그네슘으로서 50mg)	
산화아연(KP)	62.5mg
(아연으로서 50mg)	
우르소데옥시콜산(KP)	10mg

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성산화규소, 탭실드노란색(21Y024), 탭실드클리어(71C152), 히드록시프로필셀룰로오스

성상



황갈색의 장방형 필름코팅정

효능·효과

1. 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기

(2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 강심배당체를 투여 중인 환자
- (7) 신장결석 병력이 있는 환자
- (8) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 묽은변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- (2) 피리독신을 1일 500 mg~2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- (7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 각기
- 눈의 피로
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

용법·용량

성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자.
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

60정/병, 120정/상자(60정/병X2)

- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2020년 7월 28일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 등 검색(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

제조사 : 한국코러스㈜

충청북도 제천시 강저로 30

판매자 : ILDONG 일동제약주식회사

경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010