

온누리

에스·빌아세트

Acetaminophen · Paracetamol 325mg Soft cap

Pain relief
Fever reducer



비타민·비타민
비타민·비타민

약상온누리

한약의약품
분류번호 114

325.00mg

[한약의약 및 그 분량] 1250 주

- 유효성분: 아세트아미노펜(325mg)
- 첨가제: 폴리에틸렌글리콜, 폴리(디옥산-가죽)
- 기타 첨가제: 소르비톨, 소르비탄, 인산나트륨, 정제수, 포도, 폴리(디옥산)400, 폴리(디옥산)400
- [성상] 미황색의 투명한 액이 든 주황색의 투명한 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 주요 효능: 소염
2. 간헐적 발열 및 통증(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 외상후통(통증)
3. 다음 질환에도 사용할 수 있다.
4. 치통, 관통통, 류마티스관통통(통증)

[용법·용량]

1. 만 12세 이상 소아 및 성인:
 - 1회 2캡슐(1회 3~4회/4~6시간) 필요시 복용한다.
 - 1일 최대 4캡슐(12시간을 초과하여 복용하지 않는다).
2. 아약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
 - 1) 매질 이상 산장 장기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
 - 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포형(급성전신성 발진성 고열발진성VAGEF), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 해야 한다.
 - 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용해서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용해서는 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민한 환자
 - 2) 소화성궤양 환자
 - 3) 심한 혈액 이상 환자
 - 4) 심한 간장애 환자
 - 5) 심한 신장기능장애 환자
 - 6) 심한 심장기능장애 환자
 - 7) 아스피린 전신스테로이드성 소염제(항염제)에 의한 전신발작 유발) 또는 그 병력이 있는 환자
 - 8) 다음의 약물을 복용한 환자: 바르비탈, 약용, 삼한계 항우울제
 - 9) 알코올을 복용한 사람
3. 다음과 같은 사람은 약물을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
 - 2) 신장기능장애 또는 그 병력이 있는 환자
 - 3) 소화성궤양의 병력이 있는 환자
 - 4) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자
 - 5) 술을 마시거나 있는 환자(술을 마시거나 흡연이 나타날 수 있다.)
 - 6) 심장기능이상인 환자
 - 7) 과민증의 병력이 있는 환자
 - 8) 기타 전신 환자
 - 9) 고령자 노인
 - 10) 일부 또는 소수
 - 11) 위파를 장기복용하는 환자
 - 12) 다음의 약물을 복용한 환자: 리튬, 차아아미노산
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 꼭 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상습적 가능한 한 이 처방전을 소지할 것.
 - 1) 속: 4. 아세트아미노펜 중독(과민성) 증상: 호흡곤란, 오한이 붉어짐, 혈관부기, 두드러기 등, 전신발작
 - 2) 약: 혈소판 감소, 괴혈구빈혈, 용혈성빈혈, 파골세포빈혈, 메트헤모글로빈빈혈, 혈소판기능 저하증(혈소판), 약전, 장색소

- 3) 과민증: 과민성증상(구토, 호흡곤란, 발진, 발열, 설사)
- 4) 소변: 구역, 구토, 식욕부진, 장기(복통) 이상, 소화불량, 소변(배설) 등의 위장장애 이상반응
- 5) 피부: 발진, 알레르기 반응, 피부장악인 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중증성피부 괴사증(리델 증후군)
- 6) 기타: 기타 투여시 만성간사, 급성(급성)간사, 만성간사, 신장(신장)독성
- 7) 과민증: 간사, 신장(신장), 신장의 과사
- 8) 이 약에 대해 시판 후 조사에서 보고된 추가적 이상반응은 아래 표와 같다. 발현빈도는 매우 흔히 >1/10, 흔히 >1/100 및 <1/100, 흔하지 않게 <1/1,000 및 <1/100, 드물게 >1/10,000 및 <1/10,000, 매우 드물게 <1/10,000 이다.

면역계 장애
매우 드물게: 아나필락시스 반응, 과민증
피부 및 피부(피부)이상적 장애
매우 드물게: 두드러기, 소양성(가려움) 발진, 발진

표: 자발적 보고로부터 추정된 빈도에 따른 이 약의 시판용 경험에서 밝혀진 이상반응
9) 국내 투약성 효과(효과)의 분기, 평가에 따라 다음의 이상반응을 추가한다.
간기능장애: AST 상승, ALT 상승
피부: 고장발진

5. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

- 1) 일반적주의
 - (1) 과민증(증)을 예방하기 위해 충분한 상습을 받아야 한다.
 - (2) 소염제(항염제)에 의한 치료는 원인이 없는 대증요법(증상)로 치료하는 방법이다.
 - (3) 만성질환(증)에 사용되는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
- 가. 장기복용하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 받고 이상이 있을 경우 감람(감람), 복통(복통) 등의 적절한 조치를 해야 한다.
- 나. 약용(약용) 이외의 치료(치료)도 고려한다.
- (4) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
- 가. 급성질환 및 발열의 정도를 고려하여 복용한다.
- 나. 원칙적으로 동일한 약물의 장기복용은 피한다.
- 다. 원인이 없는 경우에는 실시한다.
- (5) 소아 및 고령자(노인)는 최소 필요량을 복용하고 이상반응을 유의한다. 과도한 체온(고열), 아열, 사자간(사자간) 등이 나타날 수 있으므로 특히 고열을 수반하는 소아 및 고령자(노인) 또는 소염제(항염제)의 경우, 복용 후의 상태를 충분히 살펴야 한다.
- (6) 다른 소염제(항염제)와 함께 복용하는 것은 피한다.
- (7) 의사 또는 약사의 지시 없이 복용에 10일 이상(노인) 또는 5일 이상(소아)이 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 않는다. 증상이 발열 증상이 지속되거나 발열 발열 정도, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- (8) 이 약 복용시 간기능을 감시(감시) 나타내지 않 수 있으므로 간기능이 약한 환자의 경우와 의사(의사)에 따라 적절한 혈검(혈검)을 함께 복용해야 한다.
- 2) 과민(과민)의 처리
 - 이 약을 과민(과민)이 어떠한 약(약)에 중(중)이거나 장(장)이 없더라도 신(신)과 의(의)학(학) 처(처)를 받아야 한다. 10~12시간 이내에 N-아세트아미노펜(아세트아미노펜) 정(정)과 수(수)를 투(투)여 방(방)기나 매(매)치(치)를 경(경)구(구)복(복)용(용)하(하)는 것(것)을 보(보)호(호)해야(하)는 것(것)이다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 기온(기온): 실온(15~30°C)보관
- 2) 변(변)의 손(손)이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 3) 약(약)을 용(용)액(액) 용(용)기(기)에서 꺼(꺼)내(내)는 것(것)을 용(용)기(기)에 보(보)관(관)하는 것(것)은 약(약)물의 오(오)염(염) 및(및) 사용(사용)에 따(따)른 사(사)고(고) 발생(발생)이나 약(약)물의 불(불)충(충)족(족) 하(하)의 현(현)이 될 수 있으므로 용(용)액(액) 용(용)기(기)에 넣(넣)고 꼭(꼭) 닫(닫)아 보(보)관(관)한다.

[보관방법] 1250 주

[저장방법] 기온(기온): 실온(15~30°C)보관

[사용기한] 제조일로부터 24개월

[제조지] 코스텍스(파라) / 충청북도 제천시 바이오파미3로 30 빌딩

[제조(제조)지] 이원제약(파라) / 충청북도 제천시 의안로 한신로 69-10

[판매처] 온누리(온누리) / 서울특별시 양천구 목동로 159-1 13층

[소비자상담실] 02-569-5662 (반말 및 교환처: 구입처)

* 본 약(약)은 엄(엄)격한 품질(품질)관(관)리를 한(한) 제(제)품(품)입니다. 만약 구입(구입)시 사용(사용)기한(기간)이 경과(경과)되었거나 변(변)질(질)·변(변)해(해) 또는 오(오)염(염)되거나 손상(손상)된 제(제)품(품)은 구입(구입)처를 통해(통해) 교환(교환)하여 드립니다.

* 이 처방(처방)문서(문서) 작성(작성)일자(날짜) 2020년 06월 03일 이후 변경(변경)된 내용(내용)은 식품(식품)의약품(의약품)안전(안전)처(처) 의약품(의약품)통합(통합)정보(정보)시스템(시스템)(<https://medug.mfds.go.kr>)에서 확인(확인)하실 수 있습니다.

* 의약품(의약품) 용(용)어(어) 설명(설명)서(서) 기타 제(제)재(재)의 의(의)약품(의약품) 정보(정보)는 식품(식품)의약품(의약품)안전(안전)처(처) 의약품(의약품)통합(통합)정보(정보)시스템(시스템)(<https://medug.mfds.go.kr>)에서 검색(검색)할 수 있습니다.

* 의약품(의약품) 투(투)입(입)처(처) 신청(신청)은 한국(한국)의약품(의약품)안전(안전)관리(관리)원(원)(<https://www.orussafe.or.kr>, 044-6223)에서 하(하)실 수 있습니다.

작성(작성)년월(년월): 2020. 06. 03
8074-00

이원제약주식회사
충북 제천시 의안로 한신로 69-10