

마그네슘 · 활성비타민 B₁이 함유된 센스온 액티브 연질캡슐



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중,

◆ 유효성분

신화마그네슘(KP)	349mg (마그네슘으로서 210.48mg)
토코페롤아세티이트(KP)	500mg (비타민E로서 500IU)
벤토타민(KP)	50mg (타이민염산으로서 36.15mg)
리보플라빈(KP)	25mg
피리독신염산염(KP)	50mg
시아노코발라민(KP)	0.5mg
갈마오리자놀(KP)	5mg
유비테카레논(KP)	5mg

◆ 첨가제 - 타르색소 : 적색40호, 청색1호, 황색5호

- 동물유래성분 : 숙산산젤라틴(소·가축), 젤라틴(소·가축)

◆ 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 에틸바날린, 콩기름, 폴리소르베이트80

[성상] 황색의 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆, B₁₂의 보급

◆ 육체피로 ◆ 임신·수유기 ◆ 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 ◆ 노년기

◆ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 말초혈행장애 및 경년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기 · 눈의 피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 산부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테로제, 트리아미테논과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 오를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오염(질문 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60 캡슐/상자 ((10캡슐/피티프) x 6) [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 약약품통합정보시스템

(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎ 080-777-5678 : 수신자 요금 부담)로 문의하십시오

● 제 조 자 한국프라임제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주신단9로 100

● 제조의뢰자 Dongkook 동국제약주식회사 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19