

만족도 높은 대포장 종합구충제

알벤다졸

(알벤다졸)

[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분: 알벤다졸(USP).....400mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소): 황색5호
- 기타 첨가제: 라우릴황산나트륨, 스테아르산마그네슘, 아스파탐, 오렌지미크론, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴로이드성이산화규소, 탭크, 폴리소르베이트80, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스, D-만니톨

[성상] 연한 주황색의 방형형 필름코팅제

[유용·효과] 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

[용법·용량]

성인 및 24개월 이상의 소아는 아래의 양을 복용

- 1) 요충: 1일 1회 알벤다졸로서 400 mg를 복용한다. 박멸을 위하여 7일 뒤, 한번만 더 이 약으로서 400 mg를 복용한다.
 - 2) 회충, 십이지장충, 편충, 아메리카구충: 이 약으로서 400 mg를 단회(1회) 복용한다.
 - 3) 분선충의 다른 기생충(조충)과 중증 혼합 감염시: 1일 1회 이 약으로서 400 mg 씩 3일간 복용한다.
- 삼키기 어려울 경우 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요 없다(경제, 저작(씹기)장애 한함).
- 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 투여를 실시할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

※ 1일 허용량 제한
아스파탐 함유량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한한 최소량 사용)할 것.
60kg 성인: 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 2세 미만의 소아
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 테오필린: 테오필린의 대사를 억제할 수 있다.
- 2) 시메티딘, 프라지관텔, 덱사메타손: 알벤다졸의 혈장농도를 증가시킨다.
- 3) 리토나비어, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바르비탈: 알벤다졸의 혈장 농도를 감소시킬 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 간장애 환자
- 2) 신장애(신장장애) 환자
- 3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 피부점막만증후군(스티븐스-존슨 증후군), 다형홍반(여러 모양의 붉은 반점)이 나타날 수 있다. 이러한 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다.
- 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부 또는 복부(배부분) 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지럼이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 발열, 전신 발적(총혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 두드러기 등의 과민반응이 나타났다는 보고가 있다.
- 4) 가역적인(회복 가능한) 탈모증이 나타날 수 있다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임(임신가능성 있는)연령의 여성은 생리 첫 10일 동안 또는 임신 테스트에서 음성인 후 나타난 후에 치료를 시작할 것.
- 2) 동물 생식 연구 결과 이 약은 임부가 투여하였을 때 태아 손상을 유발할 수 있다. 랫트와 토끼에서 기관 형성 기간 동안 투여 시(전체 신체 표면적에 대하여 정량화된 사람 권장 용량의 약 0.1-0.6 배를 경구 투여(복용)) 배아 독성 및 골격 변이가 보고되었다. 태아의 잠재적 위험을 고려하여 임신가능성이 있는 여성은 이 약의 투여기간 동안 및 마지막 투여 이후 3일 까지 효과적인 피임 방법을 사용한다.
- 3) 임상검사치에의 영향: 때때로 가역적인(회복 가능한) 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 경증 내지 중등도의 간효소치가 증가할 수 있다. 처방 시 병혈구(전체혈구)감소증을 유발할 수 있다.
- 4) 프라지관텔이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있다.
- 5) 과량투여 했을 경우 대증요법(증상별로 치료하는 방법)(위세척) 및 일반적인 지지 요법을 사용한다.
- 6) 조충(taeniasis) 감염이 높은 지역에서 기존의 뇌유낭미충증(neurocysticercosis)에 대한 알벤다졸 치료가 이루어진 경우, 뇌내 기생충 사멸에 의한 염증 반응으로, 발작, 두개내압상승, 소증상과 같은 신경학적 증상들이 나타날 수 있으며, 증상들은 치료직후 발생될 수 있다. 이 약을 복용한 후 이러한 증상들을 보인 환자들은 바로 의료진과 상의한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하여 건냉(건조하고 시원)한 곳에 실온 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)-남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 2정/상자(2정/PTPx1), 6정/상자(6정/PTPx1), 10정/상자(10정/PTPx1), 100정/병.

[제품문의] ㈜더유제약 080-200-5724

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 따라 엄격한 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 혹은 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후 본 의약품의 최신 정보를 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원 (1644-6223)

작성(개정)연월일: 2020.06.16
M200601

[제조회사] ㈜더유제약

경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-151 1층, 2층

[제 조 자] ㈜한국파비스제약

경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127



The U Pharmaceuticals
(주)더유제약

경기도 남양주시 진접읍
경복대로바람골길 42-151