

덴트업정

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분: 옥수수불검화정량추출물(생규) ... 35.0mg(중 스테롤로서 7mg)
후박75%에탄올연조엑스(5→1)(별규) ... 70.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 첨가제(타르색소): 청색2호, 황색4호, 황색5호
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 주형색 200F630014, 오파드라이 흰색 21K58794, 클로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

[성상] 주형색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 치주(치아주위조직)치료 후 치은염(잇몸염), 경·중등도 치주(치아주위조직)염의 보조치료

[용법·용량]

초기량: 1회 2정 1일 3회 식전에 경구투여(복용한다)

유지량: 1회 1정 1일 3회 식전에 경구투여(복용한다)

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 한다.
- 2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의한다.
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다)
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 가벼운 원하작용을 일으킬 수 있다.
- 2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있다.
- 3) 국내에서 만성치주(치아주위조직)염 환자 55명을 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 이상반응을 발현부위별로 분류하면 다음과 같다.
 - (1) 소화기계 : 소화불량, 과민성대장염 환자에서의 증상 악화, 구강(입안)궤양
 - (2) 간 및 담도(담관)계 : ALT 증가, 총 빌리루빈 증가
 - (3) 피부 및 부속기계 : 얼굴 및 목의 가려움
 - (4) 대사 및 영양계 : 얼굴부종(부기)
 - (5) 기타 : 청력이상, 잇몸통증
- 4) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 국내 임상시험결과 옥수수불검화정량추출물 단일제와 후박75%에탄올연조엑스를 함유한 복합제 간의 유의성 있는 유효성 차이는 없었다.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 장기간 계속하여 복용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 100정/병, 300정/병

[제품문의처] 02)3485-0476

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 최종개정연월일 : 2020.10.19
- ※ 이 제품 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의 '의약품 등 검색'란을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)