

종근당의 iLet 특허 공법으로 정제사이즈가 작습니다.
(innovative Low excipient tablet)


이튼큐[®] 플러스 정

일반의약품

치주질환 보조치료제

옥수수불검화정량추출물

후박75%에탄올연조엑스(5→1)



초기복용 : 1일 3회, 1회 2정 식전 복용, 유지요법 : 1일 3회, 1회 1정 식전 복용

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

▶ 조성·성상

1. 원료약품의 분량 : 1정 중 유효성분 : 옥수수불검화정량추출물 (KHP)35.00mg(총 스테롤로서 7mg), 후박75%에탄올연조엑스(5→1) (별규) 70.00mg, 첨가제(타르색소) : 청색2호, 황색4호, 황색5호, 기타첨가제 : 경질무수구산, 메타규산알루미늄산마그네슘, 무수인산수소칼슘, 스테아르산마그네슘, 아크릴이스트MP 흰색(93018508), 오파글로스클리어 (97W19196), 오파드라이AMB주황색(80W630014), 오파드라이흰색(OY-C-7000A), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 포비돈

2. 성상 : 주황색의 원형 필름코팅정

▶ 효능·효과

치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료

▶ 용법·용량

초기량 : 1회 2정 1일 3회 식전에 경구투여

유지량 : 1회 1정 1일 3회 식전에 경구투여

▶ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.
- 2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의합니다.
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.)
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 가벼운 원하작용을 일으킬 수 있습니다.
- 2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있습니다.
- 3) 국내에서 만성치주염 환자 55명을 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 이상반응을 발현부위별로

분류하면 다음과 같습니다. (1)소화기계 : 소화불량, 과민성대장염 환자에서의 증상 악화, 구강궤양 (2) 간 및 담도계 : ALT 증가, 총 빌리루빈 증가 (3) 피부 및 부속기계 : 얼굴 및 목의 가려움 (4) 대사 및 영양계 : 얼굴부종 (5) 기타 : 청력이상, 잇몸통증
4) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 국내 임상시험결과 옥수수불검화정량추출물 단일제와 후박75%에탄올연조엑스를 함유한 복합제 간의 유의성 있는 유효성 차이는 없었습니다.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 3) 장기간 계속하여 복용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【주의】

- 1) 개봉 후에는 타 제품과의 혼입 및 혼용(섞어쓰기) 되지 않도록 주의해야 합니다.
- 2) 충분한 양의 물과 함께 복용해야 합니다.
- 3) 제품 개봉시 또는 취급시 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

【저장방법】 밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

【포장단위】 200정/상자[(100정(10정/PTP)X10)/상자X2], 500정/병
구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환해야 합니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격엑소 제품

®=등록상표 101



종근당



본사 : 서울특별시 서대문구 종정로 8 (충정로3가)
공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 광항로 797-48
구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

소비자 중심 경영
공정거래위원회 | 한국소비자원

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
이 첨부서 작성일자(2020. 06. 08)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지 (www.cdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.