

덴큐[®] 플러스^정

일반의약품

분류
번호

231
(치과구강용약)

(옥수수불검화정량추출물 · 후박75%에탄올연조엑스(5→1))

원료약품 및 분량 (1정 중)

- 유효성분 : 옥수수불검화정량추출물(KHP)(총 스테롤로서 7mg) 35.0mg, 후박75%에탄올연조엑스(5→1)(별규) 70.0mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 2호, 황색 4호, 황색 5호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 주황색(200F630014), 오파드라이 흰색(21K58794), 콜로이드성산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

성상

주황색의 원형 필름코팅정



효능·효과

치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료
※ 쉬운용어정리 : 치은염(잇몸염), 치주(치아주위조직)

용법·용량

1. 초기량 : 1회 2정, 1일 3회 식전에 경구투여(복용)합니다.
2. 유지량 : 1회 1정, 1일 3회 식전에 경구투여(복용)합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.
 - 2) 이 약은 폴레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의합니다.
 - 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.)
 - 4) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

※1215301-1200601

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 가벼운 완하작용(변을 부드럽게 보게 함)을 일으킬 수 있습니다.
- 2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있습니다.
- 3) 국내에서 만성치주염 환자 55명을 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 이상반응을 발현부위별로 분류하면 다음과 같습니다.
 - (1) 소화기계 : 소화불량, 과민성대장염 환자에서의 증상 악화, 구강궤양
 - (2) 간 및 담도계 : ALT 증가, 총 빌리루빈 증가
 - (3) 피부 및 부속기계 : 얼굴 및 목의 가려움
 - (4) 대사 및 영양계 : 얼굴부종
 - (5) 기타 : 청력이상, 잇몸통증
- 4) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 국내 임상시험결과 옥수수불검화정량추출물 단일제와 후박75%에탄올연조엑스를 함유한 복합제 간의 유의성 있는 유효성 차이는 없었습니다.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 3) 장기간 계속하여 복용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

포장단위

120, 240, 300 정

- ※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- ※ 이 설명서는 2020년 6월 1일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

제조사
한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조의뢰자
ILDONG 일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우로27길 2
공장: 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※1215301-1200601