

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하세요.

고함량 셀레늄 함유 비타민 D3군

Maxelen-D Tab.

맥세렌디정

Selenium 200µg
Vitamin D₃ 1,000IU

일반의약품

분류번호: 319

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(293mg)중

유효성분 : 아셀렌산나트륨오수화물(EP) 0.666mg
(셀레늄으로서 200 µg)
클레칼시페롤농축분말(EP) 10mg
(비타민D로서 1,000 IU)

※ 동물유래성분 : 클레칼시페롤농축분말(소 / 가축부위), 셀락토오스(소 / 우유)
※ 기타첨가제 : 경질무수규산, 수크랄로스, 스테아르산나트륨, 크로스카멜로스나트륨,
크로스포비돈, 포비돈, D-만니톨

【성상】

흰색의 양면이 볼록한 원형 정제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D의 보급
- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 D의 효능 · 효과는 다음과 같다.
· 뼈, 이의 발육불량
· 구루병의 예방

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 첫아이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 세사제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다

- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 피부염, 땀·호흡기 약화, 탈모, 조급증
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 3) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 PTP) 21 정/피티피, 42 정/피티피, 63 정/피티피

【제조번호】 용기에 별도표시

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태 또는 오손된 제품을 구입하신 경우 병·의원, 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 최초작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.mcncultyparm.com) 또는 전화(031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다.
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하시기 바랍니다.
※ 의약품 사용 후 부작용 발생시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제신청을 할 수 있습니다.

최초작성일자 : 2020.10.13
MSD-2010-00

제조사 : **McNulty** 한국맥널티(주)
Pharmaceutical

충청남도 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46
www.mcncultyparm.com