

리케락캡슐

(바실루스리케니포르미스균)

LCCI-001
2c0711-01

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중,

- **유효성분:** 바실루스리케니포르미스균(별규) 250mg
(바실루스리케니포르미스균으로서 2.5×10^8 마리)
- **첨가제**(동물유래성분): 유당수화물(소-우유), 젤라틴(소-우내피, 돼지-돈피)
- **기타첨가제:** 미결정셀룰로오스, 상하부 흰색의 경질캡슐, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

[성상] 흰색의 분말이 든 상부 하부 흰색의 캡슐제

[효능·효과] 급·만성장염, 급·만성설사, 급성이질, 각종원인에 기인한 장내 이상발효

[용법·용량]

- 성인: 1회 2캡슐 1일 3회 복용(첫회에는 4캡슐 복용)
- 어린이: 1회 1캡슐 1일 3회 복용
- 유아의 경우 캡슐 내용물을 소량의 물이나 우유에 타서 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

본제는 항생물질과 병용투여하여도 되나 시프로플록사신, 이미페넴, 실라스타틴나트륨과의 병용투여는 피하는 것이 좋다.

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
의사의 치료를 받고 있는 환자
3. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4. 소아에 대한 투여
3개월 미만의 영아에게 투여할 경우 약사 또는 의사와 상의한다.
5. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[포장단위] 30캡슐/병, 300캡슐/병

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678; 수신자 요금 부담)로 문의 주십시오.

※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

▪ 제조의뢰자: **동국제약(주)** 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

▪ 제조자: **(주)바이넥스** 부산광역시 사하구 대대로 368-3

설명서 최종 개정 연월일: 2022.09.05

2c0711-01