

생약 복합성분의 치주질환치료제

일반의약품

덴탈큐[®]

정

Dental Q Tab

의약품 등록번호	231
치과 구강용약	

원료약품의 분량 (1정 중)

- 유효성분 : 옥수수불균화정향주출물(생구) 35mg
후박75%에탄올원액소(5-1)(분구) 70mg
- 첨가제(타르색소) : 황색2호, 황색4호, 황색5호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스102, 스테아르산마그네슘, 오파드로스 2 플러 (97W9196), 오파드로스 200, 오렌지 (200F630014), 오파드로스 화이트 (103B28796), 폴리비드정아산화규소, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

성상

■ 주황색의 원형 필름코팅정

효능 · 효과

■ 치주(치아주위조직) 치료 후 치은염(잇몸염), 경 · 중등도 치주염(치아주위염)의 보조 치료

용법 · 용량

- 초기량 1회 2정 1일 3회 식전에 경구투여(복용합니다)
- 유지량 1회 1정 1일 3회 식전에 경구투여(복용합니다)

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.
이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하도록 합니다.
1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.
- 이 약은 클레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.)
- 이 약은 황색4호(타르색소), 황색5호(산성염료) FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중을 하여 투여해야 합니다.(황색4호(타르색소), 황색5호(산성염료) FCF) 함유제제에 한함).
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의해야 합니다. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하도록 합니다.
- 가벼운 관하작용을 일으킬 수 있습니다.
- 전신 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있습니다.

3) 국내에서 만성치주염(치아주위염) 환자 55명을 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 이상 반응을 발견 부위별로 분류하면 다음과 같습니다.

- 소화기계 : 소화불량, 과민성대장증 환자에서의 증상 악화, 구강궤양
- 간 및 담도기관, 쓸개(담낭) : ALT 증가, 총 빌리루빈 증가
- 피부 및 부속기계 : 얼굴 및 목의 가려움
- 대사 및 영양계 : 얼굴부종(부기)
- 기타 : 정맥아성, 잇몸통증
- 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 국내 임상시험결과 옥수수불균화정향주출물 단일제와 후박75%에탄올원액소를 함유한 복합제 간의 유의성 있는 유효성 차이는 없었습니다.

- 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜야 합니다.
- 장기간 계속하여 복용하지 않아야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관해야 합니다.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 위험(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 약력을 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 잘 닫아 보관해야 합니다.

저장방법

■ 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

- 270정/상자(90정/병 x 3), 270정/상자(90정/피티파 x 3), 240정/상자(120정/병 x 2), 240정/상자(120정/피티파 x 2), 200정/상자(100정/병 x 2), 200정/상자(100정/피티파 x 2), 300정/상자(150정/병 x 2)

첨부문서 시행일자

2020.06.29

· 이 첨부문서 시행일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 www.jw-pharma.co.kr/에서 확인하실 수 있습니다.

교환 및 제품문의

- 본 약품들은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질 · 부패 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
- 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오. 연락처 : 고객만족팀(1588-2675 / 080-090-6777(주신자부담))
- 본 약품 투여 또는 복용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물안전센터(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 통급 기관에 약품의 투여 또는 복용 후 부작용(이상반응)을 하십시오.

【제조회사】제이더블유중외제약(주) 송남 당진시 송악읍 한진길 56

【제 조 자】(주)제이더블유중외제약 경북 경산시 천왕읍 공단6로24길 18

최초제약



중외제약

제이더블유중외제약(주)

충남 당진시 송악읍 한진길 56

통급 1588-2675 / 080-090-6777

한진길 56-2-200-4