

플루코 캡슐

양·한방 복합성분 종합감기약



이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

[첨부분서 작성일자] 2020년 07월 21일

[유효성분]

1캡슐(400mg) 중

아세트아미노펜(KP)	150mg
슈도에페드린염산염(KP)	12.5mg
덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP)	7.5mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
갑근탕건조엑스(10→1)(생균)	100mg

[효능·효과]

감기의 제증상(여러 증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[오공 · 오공]

만 15세 이상 : 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후 30분에 복용한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[제조번호], [사용기한] (연, 월, 일, 까지)별도표기

[성상] 옅은 갈색 또는 갈색의 가루가 든 상부 주홍색, 하부 미황색의 캡슐제

[포장단위] 10캡슐(10C/PTP x 1ea)

[첨가제]

- 기타 첨가제:옥수수전분, 콜로이드성이산화규소,전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 캡슐

[제조사] 경방시약(주). 인천광역시 남동구 남동대로 394

[판매자] 신신제약(주), 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

소비자상담실 : 02) 2030-1745 www.sinsin.com

★ 본 제품의 자세한 허가사항은 의약품아저나인 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

★본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질변패 또는 오염된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

★ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)



플루코 캡슐

양·한방 복합성분 종합감기약

이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

2007-01

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 머리 췌장 이상 3) 적도 수술 따지는 사람이 이 예나 다른 폐절전술을 적용해야 할 경우 유별할 수도 있다 또는 약사의 상행이 없다. 이러한 한자 이 약을 복용한 뒤 감수성 유발될 수 있다. 2) 아이터트(아기용)를 복용한 한자에서 피부 두드러지 같은 전신성 발진성 농포증상 전신성 발진성 고름결핍증(AGEF) 스테로이드 - 존슨 증후군) 피부 부종 피하 괴사형(TNF)와 같은 중대한 피부 반응을 보고되었고, 이는 종종 매우 드물게 발생적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부 반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고 이 약 투약 후 피부발진의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다. 3) 이 약은 아세트산염을 함유하고 있다. 아세트산염은 0.05% 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상 유발 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용해서는 안 된다. 아세트산염이 포함된 제품은 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다. 4) 노인에게서 드물게 위양성 위벽 검사 결과 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 발진성 증상 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 흉통(또는 변질), 다수의 작은 농포(모두 림프와 함께 중심성) 관찰할 경우 이 약의 복용을 중단하고 즉시 의사와 상의하여야 한다.

2 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람, 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람, 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기), 4) MAO 억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

전해(기침을 그치게 함)가담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

[illegible]

치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨와, 통풍과, 관절염과, 항응고제, 스테로이드 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 개개가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 하 이 첩보문서를 수지할 것.

(1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진 발생(출혈되어 붙어짐), 기침, 구토 등 식욕부진, 배탈, 두통(두근거림), 메스꺼움, 눈곱, 목쉼(자복사) 기타 모든 증상, 어떠한 증세, 열발, 변비 및 기타 의약품에 대해 의도적으로 과용한 증상이 나타난 경우 ① 속이(나뭇막시): 복통후 바로 두드러기, 부종(붓기), 가슴앓이, 황갈색 발진 현상이 나타나고, 손발이 차갑고, 식은 땀이 관류되는 듯 나날 수 있다. ② 피부병변: 전신에 걸쳐 소양성-홍조반출증, 중증성 홍조반출(사태)을 일으키는 : 고열을 동반하고, 발진 발생(출혈되어 붙어짐), 화상과 같이 결미가 생기는 등의 심한 증상이 전신으로, 머리카락은 한 달에 나날 수 있다. ③ 급성 전신성 홍조성 반응증 (AGRP): 발진, 흉통(심장박동), 두통, 구역, 구역질, 두통, 관절염과 같은 증상 때 마다 신변증이 나타날 수 있다. ④ 천식: ⑤ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위) 황색을 띠게 됨(노란) 될 수 있다. ⑥ 간질환때: 위장을 동반하고, 술과 함께 호르몬 불균형 등이 나타난다. ⑦ 약물독성중독증: 오랑(노랑)초까지 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 발생할 수 있다.일부 병환은, 혈당수치를 낮추는 제약을 가진 사람에게는 더욱하여 부작용을 증가시킬 수 있음. 폐활량 측정, 호흡기 체적의 약화, 체중, 두통(두근거림), 체중증가 등의 위험도악제내증은 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고) 이상적인 환자는 정맥 투여를 중지할 것. ⑧ 편광현상(고열): 저혈압, 근육의 경직되고 강경(강직)상태에서 나타날 수 있으므로, 관전술을 충분히 하고; 사정권, 사정권, 마비 또는 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. ⑨ 슈도알레르딕 반응과 관련하여 허혈성 질환의 증상(관상동맥 협착, 작열 출혈 등)이 발현될 경우 3) 5 ~ 6 회 복용후에 다시 복용하지 않을 것을 권유

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 용량을 잘 지키라. 2) 장기간 계속 복용하지 말라. 3) 복용시에는 음주하지 말라. 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 등 구가 구토나 두통과 같은 부작용이 기어올라 올 때는 복용을 피 할 것. 5) 바르비탈산의 용해, 삼킴에 항응고제 및 알코올을 포함한 약물은 다량의 에틸브로마이드를 내시킴으로써 뇌혈이 강도되어 야마르미노이드-펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 6) 칼륨결핍증, 갑상선증, 글리시리산산증 또는 그 염류 함유제, 루프카 나트륨(푸로세미드, 에우라신) 또는 티아지드 나트륨(테리클로로메타이드)과 병용(함께 복용)시에는 위담도 비배출증이나 지혈불능증으로 하여 급성지혈제나 나트륨 사염으로 삼킴 부작용을

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.