



이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

[첨부문서 작성일자] 2020년 07월 21일

[유효성분]	1캡슐(448.5mg) 중
텍스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)	10.0mg
DL-메틸에페드린염산염(KP)	12.5mg
노스카핀(KP)	10.0mg
구아아폴설펜산칼륨(KP)	45.0mg
카르비녹사민말레산염(USP)	1.5mg
감초가루(생규)(글리시리진산으로서 2.5mg)	100.0mg
길경가루(생규)	150.0mg

[효능 · 효과]

기침, 가래

[용법 · 용량]

만 15세 이상 및 성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후복용

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조번호], [사용기한] (연. 월. 일. 까지)별도표기

[성상] 미향색의 분말이 든 상부 주황색 하부 황색의 캡슐제

[포장단위] 10캡슐(10캡슐/PTP×1ea)

[첨가제]

- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소 · 우유)
- 첨가제(타르색소): 적색3호, 적색 40호, 청색 1호, 황색 4호
- 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 캡슐

[제조자] 경방신약(주), 인천광역시 남동구 남동대로 394

[판매자] 신신제약(주), 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

소비자상담실 : 02) 2030-1745 www.sinsin.com

★ 본 제품의 자세한 허가사항은 의약품안전나라 의약품정보시스템(<http://medrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
★ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질현상 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
★ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)



이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

2007-01

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
2) 만 3개월 미만의 영아(절대적, 갓난아기)
3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
5) 이 약은 위장을 흡수하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
다른 전해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 알미약, 알레르기용약), 진정제
3) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
1) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영 · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영 · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발진, 발진, 관혈통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기), 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 폐쇄소변을 눌(근관 등)이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
7) 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기침이 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열, 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
8) 이 약은 황색 4호(타르타린)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구약두, 식욕부진, 어지러움, 메스(오심을 느낌) 곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 불안, 떨림, 불면
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상 증상이 나타난 경우
① 위장도스태론증 : 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이

감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고열, 설염), 부종(부기), 제중증(수종) 등의 위장도스태론증이나 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
② 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관혈을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지 할 것.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것
2) 만 7세 이하의 영(절대적, 갓난아기)유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.
3) 복용시에는 음주하지 말 것.
4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
5) 칼륨함유제, 감초함유제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이드)와 병용(함께 복용(사용))시 위장도스태론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것

- 저장상의 주의사항
1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.