

고함량 벤포티아민과 푸르셀티아민 함유
활성형 비타민B12(히드록스코발라민) 고향량

일반의약품

리드테라비

엑티브정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분

· 벤포티아민	50mg	· 이노시톨(KP)	50mg
(티아딘염산염으로서 36.155mg)(KP)		· 폴린타르타르산염(USP)	50mg
· 푸르셀티아민(KP)	50mg	· 직타용아스코르브산97%	51.6mg
· 리보플라빈(KP)	45mg	(아스코르브산으로서 50mg)(별규)	
· 리보플라빈부티레이트(KP)	5mg	· 토코페롤아세테이트 2배산	20mg
· 니코틴산아미드(KP)	50mg	(비타민E으로서 10IU)(KP)	
· 판토텐산칼슘(KP)	50mg	· 산화아연(아연으로서 24mg)(KP)	30mg
· 피리독살린산염(KP)	45mg	· 셀레늄함유건조효모	30mg
· 피리독살포스페이트수화물(KP)	5mg	(셀레늄으로서 16.2μg)(KP)	
· D-비오틴(USP)	0.1mg	· 산화마그네슘	50mg
· 폴산(KP)	0.1mg	(마그네슘으로서 30mg)(KP)	
· 시아노코발라민 1000배산	50mg	· 콜레칼시페롤과립	10mg
(시아노코발라민으로서 50μg)(KP)		(비타민D으로서 1,000IU)(별규)	
· 히드록스코발라민아세트산염	0.05mg	· 우르소데옥시콜산(KP)	10mg
(히드록스코발라민으로서 0.047mg)(KP)		· γ-오리자놀(KP)	10mg

■ 기타첨가제

경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스보든, 탭셀도판색(52Y241), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 담황색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

■ 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨 결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기
- 눈의 피로

■ 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유훈증증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 동통환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자
- 10) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 무혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 9) 항말도스테론제, 트리암테텐과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 10) 우발적으로 과량복용한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관 [사용기간] 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 120정/상자((60정/병 x 2)), 60정/병 [소비자상담실] 080-700-8487

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 소손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따라 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)
※ 변경된 허가사항 내용은 식약처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

제조회사:

한국프라임제약(주)

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

제조자:

미래제약(주)

경기도 안성시 공단2로 104

판매원:

(주)유한메디카

서울특별시 동작구 노량진로 74 6층
(대방동, 유한약행빌딩)

개정일자 : 2021.06.24(Rev.02)

