



뉴락스에프 정



생약 함유 변비 치료제

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 비사코딜(KP).....5mg
티니벨리센나열매 가루(BP).....150mg
[히드록시안트라센유도체(센노시드 B로서) 3.3mg]
- 첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 메타아크릴산공중합체 혼합기제(39G575), 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스 혼합기제(11W287)

【성상】 녹색의 원형 장용성 필름코팅정제(앞 : TG NF)

【효능·효과】

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부(배부분)팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

성인 : 1회 1~2정, 1일 취침시 공복(빈 속)시에 복용한다.
다만, 초회(처음 복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림)또는 감량(줄임)한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 급성 복부(배부분)질환(충수(맹장꼬리)염, 장출혈, 궤양성 결장염 등)환자
 - 장폐색(장차막힘) 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 직장(곧창자)의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 복부(배부분)불쾌감, 경련이 일어날 경우
 - 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
 - 복용 시 정제를 씹지 말 것.
 - 장기간 계속 사용(복용)시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정/PTP, 500정/병, 1000정/병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 및 QR코드를 참조하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 작성 연월일 : 2020. 10. 15