

콘빅600정



【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효성분	
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600.0mg
푸로셀티아민(KP)	50.0mg
나트륨산아미드(KP)	40.0mg
이노시톨(KP)	25.0mg
폴리타르타르산염(USP)	20.0mg
판토텐산칼슘(KP)	15.0mg
피리독신염산염(KP)	10.0mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서10μg)	10.0mg
리보플라빈(KP)	6.0mg
γ-오리자놀(KP)	5.0mg
클레칼시페롤과립(별규)(클레칼시페롤로서50IU)	0.5mg

■ 유효성분(동물유래성분) : 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)

클레칼시페롤과립(소의 가죽)

■ 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호알루미늄레이크

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히프로멜로오스

【성상】

갈색의 방형형 필름코팅정제

	앞	뒤
식별 표시	IH	CON

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의피로

【용법·용량】

만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 3개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 만 1세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

(4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

(5) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염)

(1) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

(2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

(3) 고지방 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

(4) 우발적으로 과량복용 한 경우

(5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 45정

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다.

◆ 소비자상담실 : 080-388-3333 (수신자부담)

※ 본 의약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국약물안전관리원(www.drugsafe.or.kr) 의약품 부작용신고 및 피해구제상담(1644-6223)을 통해 피해구제신청이 가능합니다.

※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ihwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인할 수 있음

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보 시스템 (https://nedrug.mfds.go.kr) 의약품정보 정보 참조

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

제정연월일 : 2020년 09월 14일

【제조자】 (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

【판매자】 (주)녹십자 / 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107