

LS1201005

일반의약품
분류번호: 219

라임에스정

(방통통성간조엑스(4.6→1))

【원료명 및 그 분량】 1정 중,

- 유효성분: 방통통성간조엑스(4.6→1) [별규] 475mg
- 첨가제(타르 색소): 황색5호(알루미늄레이크), 황색203호(알루미늄레이크), 적색40호(알루미늄레이크)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아린 마그네슘, 클로리달실리나디옥사이드, 크로스카멜로오스나트륨, 톱실드주황색(700245), 코비돈

【성상】 주황색의 원형 필름코팅팅

【효능·효과】

배에 피어(피부발) 치방이 많고 번개기가 있는 환자의 다음 증상: 고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 흉조, 비만, 부기, 변비

【용법·용량】 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간(식사제와 식사대 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 대량의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 총합작용에 의해 유·초산(초기분만의 위험)이 있다.
2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대량중 안티라트린은 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물을복용을 금하여나 수유를 중단한다.)
3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 콩물에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
다른 살사약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 고령제(노인)일부적으로 고령제(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람(중임)하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 지시를 받고 있을 환자(다른 약물을 투여 받고 있을 환자)
- 6) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(중증)에 악화될 수 있다.)
- 7) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(중증)에 악화될 수 있다.)
- 9) 변후의 설사(기, 현저하게 체액이 식염수인 환자(신장)만들이 함께 나타날 수 있다.)
- 10) 힘이 많이 나가는 환자(발기과다, 전신발열감 등이 나타날 수 있다.)
- 11) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 12) 배뇨(소변)를 늦추는 환자(중증)에 악화될 수 있다.)
- 13) 감람(신장)환자(중증)에 악화될 수 있다.)
- 14) 지극히 약한 의한 발진, 발적(중증)에 악화될 수 있다.)
- 15) 당뇨병 환자(합당(합당)에 의해 클리코젠의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 우려가 있다.)
- 16) 이 약인 황색 5호(산성)로 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

- 예는 신중에 투여할 것
- 7) 고지(단백질, 당, 지방)성고지질혈증 및 해장염 등 지질대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중에 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우
(1) 위일도스테론: 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(일 최대 배합량) 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼혈증, 혈당상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 붓짐), 부종(부기), 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증(근육병증): 저칼혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경직, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 소화기계: 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
- (4) 피부: 발진, 발적(중증)에 악화될 수 있다.)
- (5) 자율신경계: 불안, 명 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신분란 등.
- (6) 비뇨기계: 배뇨(소변)를 늦추는
- (7) 간기능 장애: AST, ALT, ALP, Y-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)이나나타날 수 있으므로 관찰이 충분하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 개월 정도(번)에 복용하는 경우 1주일 정도 복용하여도 증상이 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것
- 2) 자살 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 번개가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다.
- 3) 다른 약물(번)이 필요한 상태나 환자를 조시하여야 한다.
- 3) 정맥내 용법: 용량을 잘 지킬 것. 대량의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것
- 4) 다른 한약제 등(복합(복합(사용)) 투여할 경우 상약의 중복에 주의해야 한다. 대량 황유제와 병용(복합(복합(사용))) 투여 시 특히 주의할 것
- 5) 마찰 또는 예제(대)한 황유제, MAO 억제제, 감람(신장)제(특히, 리오신이나), 카테콜아민제(에피네프린, 이소프레날린, 코산틴제 제제(에피네프린, 디프로필린과 병용(복합(사용)) 시 불면, 명 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신분란 등)의 증상이 나타나기 쉬우므로 주의할 것
- 6) 칼륨(칼륨)제, 감람(신장)제, 글리시리진산 또는 그 염류 황유제, 후크코 이노제(후크코제), 에타크린산) 또는 티아지드 또는 이노제(티아지드)와 병용(복합(사용)) 투여할 경우 위일도스테론증이나 저칼혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중에 주의할 것
- 7) 지극히 약한 의한 위생이 있는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 치방이 체내(체내)로 흡수되어 고지(단백)과 관련될 경우에도 이 약의 투여를 정할 것
- 환자가 다른 정중유 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제에 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사후 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 약물을 원래 용기에 개하여 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장방법】 300정/박스

- ※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 위한 제제(제)이 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색, 오염 또는 손상된 제제는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 약품을 사용하시기전에 사용지(제)는 설명서를 주의 깊게 읽으시고 설명서를 약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 이 첨부서지 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 (<http://www.cosmaxpharma.com>) 및 신물의약품안전처 약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.

☎ 소비자상담실 031-6018-0363
약물관리부총합회 구매상담(한국약물관리안전관리 1644-6223)

COSMAX PHARMA

【제조자】 코스맥스(파주) / 총괄 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

작성일자: 2020. 10. 05
LS1201005