

비엘비정

110mg
활성형 벤포티아민

【원료약품 및 그 분량】1정 중

유효성분 :	
벤포티아민(KP)	110mg
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴산아미드(KP)	10mg
판토텐산칼슘(KP)	50mg
피리독신염산염(KP)	100mg
비오틴(USP)	0.1mg
폴산(KP)	0.1mg
시아노코발라민 1000배산(KP)	100mg(시아노코발라민으로서 100μg)
제피아스코르브산(별규)	52.1mg(아스코르브산으로서 50mg)
농축콜레칼시페롤 과립(EP)	10mg(콜레칼시페롤로서 1000IU)
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	40mg(비타민E로서 20IU)
이노시톨(KP)	30mg
콜린타르타르산염(DAB)	10mg
감마-오리자놀(KP)	5mg
산화아연(KP)	30mg(아연으로서 24mg)
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
셀레늄함유건조효모(KP)	25mg(셀레늄으로서 12.5μg)
산화마그네슘(KP)	30mg(마그네슘으로서 18mg)
유비데카레논(KP)	5.25mg
기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소, 탭실드갈색(29B061), 히드록시프로필셀룰로오스	

【성 상】

갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민B₁(원료약품 및 그 분량의 "벤포티아민")
 - 비타민B₂(원료약품 및 그 분량의 "리보플라빈")
 - 비타민B₆(원료약품 및 그 분량의 "피리독신염산염")
 - 비타민D(원료약품 및 그 분량의 "콜레칼시페롤")
 - 아연의 보급
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
 - 각기
 - 눈의피로
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - (3) 신장결석 환자
 - (4) 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - (2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - (3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - (5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - (6) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - (7) 신장장애 환자
 - (8) 저단백혈증 환자
 - (9) 강심배당제를 투여 중인 환자
 - (10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - (11) 신장결석 병력이 있는 환자
 - (12) 임부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
 - (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - (5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - (8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기)

- 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - (10) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - (11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

60정/병, 120정/병(120정(60정/병x2))

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
2. 개봉 후 충전물이 있을 경우 완전히 제거하고 사용하시기 바라며, 개봉 후 뚜껑을 잘 닫아 보관할 것. (실라카겔(건조제)을 먹지 말 것.)

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 작성연월일 : 2020. 10. 22

제조사 :  **한국코러스**

충청북도 제천시 강저로 30

판매자:  **한미약품(주)**

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무화로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게서 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품 문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.