

엑티비씨 정

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

[제품명] 엑티비씨정

[원료약품 및 구성분량] 1정(1.090mg) 중

- 유효성분 : 푸르실티아민염산염(KP)(푸르실티아민으로서 45.81mg) 50mg
아스코르빈산과립(복합아스코르브산으로서 600mg) 618.6mg
리보플라빈부타이레이트(KP) 6mg
피리독신염산염(KP) 5mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 6μg) 6mg
몰산(KP) 0.5mg
비오틴(USP) 22μg
니코틴산아미드(KP) 50mg
판토텐산칼슘(KP) 20mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 20IU) 40mg
무미르산칼슘(KP)(철로서 4.4mg) 13.5mg
산화아연(KP)(아연으로서 11mg) 13.7mg
셀레늄 가루0.1%(KP)(셀레늄으로서 26μg) 26mg
기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이한셀(OY-C-7000A), 오파드라이분홍색(200F640006), 크로스카멜로오스나트륨

[성상] 연분홍색의 정방형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, E의 보충

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
- 노년기

○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요(허리)통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈
- 비출혈(코) 예방

[용법·용량] 만 12세 이상 : 1회 1정을 1회 1정을 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 영아
- 3) 혈액소중(혈색소) 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환, 해모시(대신장)증, 비철결핍성 빈혈

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

경남제약(주)

엑티비씨 정

복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

4. 소화장애, 만성개양성대장염, 구강생식성 부위에 나타나는대장염 등의 위장질환 환자

- 5) 심장·순환기계 기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍 환자 또는 신장(콩팥)기능이 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상습적 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
: 위배상복부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적종혈되어 붉어짐, 구역, 구토, 붉은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부)부종(만), 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부(배부)부, 위통증, 경련, 열, 혼수, 피부염, 망, 호흡기 악성, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 상복부통증, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 약이 점점 없게 잘 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관 질환성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전혈관 질환의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 몰산이 부족한 환자(예 비타민E)를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 장애를 촉진시키거나 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살산증(hyperoxaluria : 혈액중에 옥살산이 과잉으로 존재하는 상태), 간소성을 일으킬 수 있다.
- 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 9) 항암도스테로네, 트라이아테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼혈증(혈중 칼슘)을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 청해진 용법·용량을 잘 지켜 것
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사자에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오염(잡물 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정

[제조자] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로 790번길 49

* 기타 주의

1. 허가된 효능·효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기간이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하십시오.
3. PTP포장을 개봉하여 복용시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으나 복용시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
4. 유효기간 사용법을 모르거나 의사(약사)가 있는 경우 의사·약사 및 자사소비자상담실로 문의하십시오.
5. 소비자상담전화 : 080-232-0600, www.kyungnampharm.com
6. 만약 구입한 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염된 제품이 발견 될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
7. 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 "http://nedrug.mfds.go.kr" → "의약품 등 검색"을 참조하십시오.

경남제약(주)