

약국에서 만나는 빠른 회복

팜편안-엠^M

일반의약품

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오

[유효성분] 1정 중

· 시메티딘(KP)	50mg
· 규산알루미늄산마그네슘(NF)	100mg
(산화알루미늄으로서 30.65mg 산화마그네슘으로서 24.1mg)	
· 히드로탈시트(BP)	125mg
(산화알루미늄으로서 21.25mg 산화마그네슘으로서 50mg)	
· 탄산수소나트륨(KP)	100mg

[첨가제]

· 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이퀀색(85F 18422), 크로스포비돈

[성상]

흰색의 타원형 필름코팅정제

[효능효과]

위통, 속쓰림, 제함, 구역

[용법용량]

- 성인(15세 이상 ~ 80세 미만) : 1회 2정씩 복용한다.
- 필요시 4시간 간격으로 1회 2정씩 1일 3회까지 복용할 수 있다.
- 단, 1일 3회(6정)를 초과하여 복용하지 말 것.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 다음 질환으로 치료를 받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장 · 간장질환, 위 · 십이지장질환, 천식, 류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다.)
- 3) 다음 약물을 복용하고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 이질제 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다.)
- 4) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있다.)
- 5) 히스타민 H₂-수용체 길항제에 과민반응의 병력이 있는 사람
- 6) 소아(15세 미만) 및 고령자(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다), 80세 이상의 고령자에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있다.
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 시메티딘은 모유 중 이행되므로 수유부가 복용할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 위장약(작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 이상반응이 나타날 수 있다.)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 졸음, 어지럼, 혼란감이 생길 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 말 것.
- 2) 이 약을 복용할 시에는 알콜음료를 섭취하지 말 것(혈중 알콜농도를 높일 수 있다.)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약물을 복용중인 사람 : 약물 상호작용에 의해 이상반응의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있다.
 - (1) 이 약에 함유된 시메티딘은 다음 약물들과 상호작용으로 이들의 배설을 지연시켜 약효가 강하게 나타날 수 있다. : 기관지확장제(테오필린 등), 혈액응고저지제(와르파린 등), 항진균제(테트라졸린 등), 벤조디아제핀계 약제(디아제팜, 트리아졸람 등), 삼환계항우울제(이미프라민 등), 협심증 · 고혈압 치료제(베타-차단제 프로프라놀롤 등), 칼슘길항제(니페디핀 등), 부정맥치료제(맥실레틴 등), 마르코라이드계 항생물질(테트라사이클린 등), 뉴-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
 - (2) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다. : 테트라사이클린계 항생물질 및 뉴-퀴놀론계 항균제
- 2) 약물에 의한 과민반응의 병력이 있는 사람

- 3) 고령자(65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리 기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 복용한다.
 - 4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 이상반응을 은폐시킬 수 있다.
 - 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
 - 6) 복통이 지속되는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
 - 7) 신장병의 병력이 있는 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상담할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 복용 직후 두드러기, 부종, 가슴답답함과 동시에 안색창백, 수족냉증, 식은땀, 숨가쁨 등 이 나타나는 경우
 - 2) 고열을 동반한 발진, 발적, 열상의 수종 등의 심한 증상이 전신의 피부, 입, 눈의 점막에 나타나는 경우
 - 3) 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움, 부종)이 나타나는 경우
 - 4) 변비, 설사, 두통, 발열, 권태감, 탈락감, 감기 증상, 하지 · 전립하출혈, 사지저림 및 굳은감, 두근거림, 횡탈, 전신부종, 혈뇨가 나타나는 경우
 - 5) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 : 다른 질환이 있을 수 있다.
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
- 1) 장기적으로 계속 복용 하지 말 것.
 - 2) 2주간을 초과하여 계속 복용하지 말 것.
 - 3) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 4) 과량 복용시에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의할 것
7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 3) 지사광산을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 작성일자(2021년 08월 31일)이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용 전 반드시 첨부문서를 확인할 것
- ※ 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국약품안전관리원 (1644-6223)

[포장단위] 30정/병

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[판매처] (주)휴비스 서울특별시 서초구 방배로 227 201호, 205호

[제조회자] 코스맥스파마㈜ 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

[제조자] (주)한국비시제약 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

[소비자 상담실] 031-8018-0364