



벤포스정

일반의약품 KGMP
적격업체

【성분 · 함량】 1정 중

· 유효성분 : 벤포티아민(KP) 300.0mg, 피라독신염산염(KP) 100.0mg
· 기타 첨가제 : 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이현색(03B28796), 오파드라이(QX)노란색(321A620000), 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 전호화전분, 콜로이드성이산화규소, 셀크, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 연한 황색의 장방형 필름코팅정

【효능 · 효과】 비타민 B1 및 B6 결핍으로 인한 신경계 질환

【용법 · 용량】 성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
이 약에 함유되어 있는 비타민 B6가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있으므로, 레보도파와 병용투여하지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 두드러기, 발진, 가려움증 등의 피부과민반응이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나면 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 이 약의 투여에 의하여 식욕부진, 복부팽만감, 구역, 구토, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 고용량의 비타민 B6(1일 1g 이상)는 단기간 복용한 경우에도 신경독성을 유발할 수 있다.
 - 이 약은 비타민 B6(피라독신)을 함유하고 있어 6개월 이상 복용 시 신경병증이 발생할 수 있다.
 - 신생아와 영아에서는 심한 진정, 저혈압 및 호흡기 장애(호흡 곤란, 무호흡)가 발생할 수 있다.
 - 우발적으로 과량 복용한 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
 - 피라독신 갈해제(예 : 히드랄라진, 이소니아지드(INH), D-페니실라민, 시클로세린), 알코올 및 에스트로겐 함유 경구 피임약의 장기 사용은 비타민 B6 결핍을 일으킬 수 있다.
 - 5-플루로우라실(5-FU)에 의해 티아민이 불활성화될 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【포장단위】 30정/병, 120 정/병(60정/병 X 2)

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【학술정보문의】 080-585-0004

※ 의약품용 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 제품은 우수 의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지나거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 의약품 용어설명, 의약품 정보, 첨부문서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

개정연월일: 2022. 02. 03

01/202202

【제조사】

 **Arlico**
알리코제약 | 주
충북 진천군 광혜원면 용소2길 21
<http://www.arlico.co.kr>