

일반 의약품

리치칼비정 300정



8 806575 037418

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■유효성분

수산화마그네슘(KP)	500mg
우르소데옥시콜산(KP)	5mg
노히엑스(EP)	100mg
(히드록시안트라센유도체로서 20.0 밀리그램)	
판토텐산칼슘(KP)	5mg
피리독신염산염(KP)	5mg
푸르셀티아민(KP)	1mg
티아민질산염(KP)	2mg

■기타첨가제

산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 톨크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과] · 변비, · 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

· 1회 1정 성인(만 15세 이상) 1일 3회, 만 11세 이상~만 15세 미만 1일 2회를 식전(식간(식사 때와 식사 때 사이)) 또는 식후에 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회(처음 복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 급성 복부(배부분)질환(중수(맹장괴괴염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자 3) 만 7세 이하의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 종혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부(배부분)불쾌감, 경련 이 일어날 경우 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것

3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 300정/병 [사용기간] 제조일로부터 36개월

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

제조원:



미래제약

경기도 안성시 공단2로 104

제조번호:

사용기한:

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ※이 문인은(2020년10월07일자)작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 미래제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우, 한국약물관리 전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※소비자상담실: 02-521-2308 / www.miraepharmkorea.co.kr

Rev.01