

파머티딘 정(파모티딘)

일반의약품

102020

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분 : 파모티딘(KP) 10mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호일루미네레이크, 황색203호일루미네레이크
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사육부위 : 젖)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 흰색 85F18422, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 클로이드성아산화규소

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 신트림

[용법·용량] 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약의 성분 및 다른 H2 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액)이나 혈변이 있는 경우
- 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
- 헉기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
- 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
- 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
- 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
- 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고 있는 경우
- 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
- 신장(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다)
- 심질환 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다)
- 간장애 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 고령자(노인)
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임산증의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)
- 다음의 약물을 복용하는 경우 : 우중추리제(이 약의 위산분비 억제작용이 아즐레 항진균(곰팡이)의(예, 이트라코나졸)의 경우 흡수를 저하시킨다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- 증상이 지속되거나 악화되는 경우
- 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
- 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.

- 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등
- 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 헴소박관소(자혈자간과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈(자간(자간)전태감, 무력, 파하(파부)적막하 출혈, 발열)
- 피부 : 피부점막안종후근, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반)
- 간 : 간기능 이상, AST(GOT) · ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈 · LDH 상승, 황달, 간염
- 근골격계 : 근육통, 황문근용해증(황문근용해), 관절통, 근육경련
- 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면홍조, 이명(귀울림)
- 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신경련, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두통감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
- 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
- 비뇨생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN · 크레아티닌 상승 등), 혈경분순
- 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련
- 기타 : 여성형유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 이 약의 투여로 위장에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
- 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
- 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 10정/상자(10정/PTP), 20정/상자(10정/PTP×2), 120정/상자(10정/PTP×12), 240정/상자(10정/PTP×12×2)

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원

(<http://www.drugsafer.or.kr> → 의약품이상사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

부광약품주식회사

제조/판매처 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 봉곡로 47
제조지 : 대한민국제1제조국 경기도 안산시 단원구 신원로 83번길 127

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통회료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.
☎ 소비자 상담실 : TEL. 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2020년 10월 20일)이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.