

브로멜장용정 45밀리그램 (브로멜라인)

경보제약 02-3220

브로멜장용정 45밀리그램 (브로멜라인)

일반의약품
조제용

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

【조성·성상】

1. 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1정 중
 - 유효성분 : 브로멜라인(별규) 45.0mg
 - 첨가제(동등물유래) : 유당수화물(소 / 유(乳))
 - 첨가제(타르색소) : 적색40호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크
 - 기타첨가제 : 진분글리콜산나트륨, 탭알드분홍색(39P407) 미강정셀룰로오스(102), 탭알드흰색(11W401), 스타아르산마그네슘
2. 성상
분홍색 타원형의 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

부종(부기)을 동반한 염증 증상의 완화, 외상(상차) 또는 수술 후의 부종(부기)

【용법·용량】

- 성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 45~90mg, 1일 3회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다.
체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
 - 2) 심한 간 또는 심한 신장질환(신장질환) 환자(혈액투석환자 등)
 - 3) 황용고체 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
 - 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
 - 5) 12세 미만의 소아
2. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에 투여하면 안 된다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 자연 적으로 빠르게 소실된다.

2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(질문사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 25℃ 이하 보관

【포장단위】 500정/병, 1000정/병

【제조자】 이연제약(주) / 총복 진천군 덕산읍 한성로 69-10

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

- ※ 본 제품은 "우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2020.06.01)이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 경보제약 홈페이지(<http://www.kbpharma.co.kr>)나 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제는 홈페이지(<http://karp.drugsale.or.kr>) 또는 전화(1644-6223)로 문의할 수 있습니다.

101 : 120120
(최종 개정연월일 2020년 12월 01일)

제조자의자 :

경보제약

본사 : 충청남도 아산시 신푼로 178
서울 지무소 : 서울특별시 서대문구 용문로 8
소매자상장식 : 02-355-2322