

판덱스 정 |덱스판테놀|

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 덱스판테놀(USP)100mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성 이산화규소, 글리세릴디베네이트, 스테아르산마그네슘

[성상] 흰색 또는 미황색의 원형 정제

[효능·효과] 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인 : 1회 1정을 1일 3회 복용합니다.
치료기간은 6주입니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 19세 미만 환자
- 3) 탈모증 이외의 사람
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 약물에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 피부: 홍진, 두드러기와 같은 피부 알레르기성 반응이 나타날 경우
- 2) 정해진 용법·용량대로 6주동안 사용하더라도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 약물의 상호작용을 피하기 위하여 최근 치료 상황을 의사나 약사에게 알려십시오.
- 3) 이 약의 복용으로 이상이 나타날 경우 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 25℃이하 보관

[포장단위] 60정/상자, 120정/상자

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2021. 03. 15 (Rev. 0)