

일반의약품

180캡슐

전립선비대에 의한 배뇨장애

글린타민[⚡]캡슐



NBK 엔비케이제약(주)
NEO BIO KOREA PHARM. CO., LTD.

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손(더럽히고 손상함)된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 소비자상담실로 문의하십시오.

※ 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품 안전관리원 ☎14-3330, 1644-6223

※ 기재사항 작성연월일 : 2023년 02월 20일

일반의약품정보

이 약을 사용하기전 반드시 본 기재사항을 확인하세요.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.
지금까지 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 일이 있는 사람.

2. 부작용

1) 소화기계 : 때때로 일과성(한번 나타나고 없어지는)의 위통, 가슴쓰림, 위부팽만감, 식욕부진, 구기(메스꺼움)등의 증상이 나타날 수 있다.
2) 기타 : 때때로 일과성(한번 나타나고 없어지는)의 두통 등의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
2) 이 약은 전립선비대증의 근본적 치료제가 아닌 대증용법(증상별로 치료하는 방법)제이기 때문에 장기 연용(계속 복용)하는 경우에는 전립선비대증의 치료를 지연시키고 그 결과 요로감염증 등이 유발될 수 있으므로 주의하여 사용할 것.

4. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전(단단히 마개로막아)하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

[사용기한] 별도 기재

[첨가제]

■ 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 캡슐

일반의약품정보

이 약을 사용하기전 반드시 본 기재사항을 확인하세요.

[유효성분] 1캡슐 중

L-글루탐산265mg(USP)
L-알라닌100mg(USP)
글리신45mg(USP)

[성상]

흰색 또는 미황색의 분말이 충전된 상부 적색 하부 황색의 경질캡슐제

[효능·효과]

전립선비대에 의한 배뇨(소변을 뚫)곤란·잔뇨 및 잔뇨감·빈뇨

[용법·용량]

성인 1회 2캡슐씩, 1일 3회 복용