

위산분비감소와 통증완화에 ~ 알미틴플러스 정

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분 : 건조수산화알루미늄겔(KP) 124.9 mg
(산화알루미늄으로서 62.45 mg)
탄산마그네슘(KP) 83.8 mg
(산화마그네슘으로서 35.20 mg)
옥세타지닌(KP) 5 mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스,
전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체한, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】 성인 1회 1정씩 1일 3회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민반응의 병력이 있는 사람
 - 2) 투석 요법을 받고 있는 사람
 - 3) 고마그네슘혈증 환자
 - 4) 고인산혈증 환자
 - 5) 변비 환자
 - 6) 장폐색 환자
 - 7) 급성 충수염 환자
 - 8) 임신초기 3개월 이내의 여성
 - 9) 만 7세 미만의 소아
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
테트라사이클린계 항생제
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - (1) 알루미늄 화합물을 함유한 약물과 다른 약제들을 동시에 복용할 때 약물의 재흡수 비율이나 정도가 증감될 수 있다. 이러한 약물로서 디곡신, 캅토프릴, 시메티딘, 라니티딘, 파모티딘, 테오필린, 프로프라놀롤, 이데놀롤, 황산철, 클로르프로마진 등이 있고, 약물의 재흡수를 증가시키는 약물로는 아세틸살리실산, 나프록센, 메토프롤롤, 레보도파 등이 있다.
 - (2) 약물의 재흡수에 의한 영향을 피하기 위해, 알루미늄이 함유된 제산제의 복용후, 1~2시간 이내에 다른 약물의 복용을 피한다.
 - (3) 임상적인 약물들의 상호작용은 다음과 같다.
 - ① 테트라사이클린 : 약물의 재흡수 감소
 - ② 시프로플록사신, 오픈록사신 : 약물의 재흡수 감소
 - ③ 케토데옥시콜린산 : 약물의 재흡수 감소
 - ④ 불화나트륨 : 약물의 재흡수 감소
 - ⑤ 이소니아지드 : 약물의 재흡수를 변화시킨다.
 - ⑥ 에녹사신, 노르플록사신, 레보테록신, 쿠마린유도체 : 약물의 재흡수를 억제한다.
 - ⑦ 철 : 약물의 재흡수 감소
 - ⑧ 클로르프로마진 : 약물의 재흡수를 변화시킨다.
 - ⑨ 탄산염류 : 알루미늄의 재흡수를 증가시킨다.
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 이 약이 모유를 통해서 분배되는지 여부에 대해서는 알려짐바 없다. 임상시험 결과 태아독성이나 기형발생은 보고된바 없다.
- 3) 고마그네슘혈증 또는 마그네슘 결핍경험이 있는 사람

4) 신장에(신장장애) 환자 및 신장기능의 병력이 있는 사람 : 장기간 사용할 때 복용량의 규칙적인 조절이 필요하다(경·중등도 신장애(신장장애) 환자에게 마그네슘이 함유된 제산제를 사용할 경우 고마그네슘혈증이 발생할 우려가 있어 세심한 관찰이 필요하다. 만성신부전 환자의 경우 고알루미늄혈증이 발생할 수 있다).

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 소화기계 : 설사, 변비, 복부(배)부종
 - 2) 과민반응 : 피부발진, 마비감
 - 3) 인산염 결핍증
 - 4) 고응고에 의한 고마그네슘혈증과 신부전
 - 5) 고응고에 의한 구강(입)안건조 또는 미각장애
 - 6) 드물게 두통, 졸음, 어지럼, 무력감 등의 증상
 - 7) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 복용할 때는 구내(입안)마비감 등을 남기지 않기 위해 신속하게 삼킬 것.
- 3) 장기적으로 계속 복용하지 말 것.
- 4) 신경조작과 뼈조작에 알루미늄의 축적에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 약박스를 원래 용기에 넣어 다른 용기에 보관하는 것은 약약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 약약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【포장단위】 10정/PTP, 20정(10정/PTP × 2), 300정/병

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조사】 (주)바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

- * 약박스를 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 약약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- * 본 약박스는 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 약박스는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 사용(유효)기한이 지난 약박스를 사용하지 않도록 합니다.
- * 약약품 부작용 발생 시 한국약약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제를 신청할 수 있습니다.
- * 소비자상담전화 : 031-692-2900
- * 작성일자 이후 변경된 내용은 약약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

작성일 : 2021. 02. 03. (Rev.0)

(주)바스칸바이오제약
BAS-KHAN BIO Pharma Inc.