


리큐비EX
아엑스정

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

벤포티아민의 특징점

01

국내최대유통량 비타민B₆(벤포티아민 300mg)과 일일최대유통량 비타민B₁₂(피리독신염산염 100mg) 조합의 고효율 활성비타민B 제품입니다.



02

당뇨병성 말초신경병증(DNP) 환자를 대상으로 6주간 용량별로 투약한 결과 3주차에서 치료효과가 나타나기 시작하여 고효율의 벤포티아민을 투약한 그룹에서의 통증감각, 진동감각을 포함한 정량적 감각신경검사(QST) 결과가 가장 좋게 나타났습니다.



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

유효성분

벤포티아민(비타민B₆)(KP) 300 mg

피리독신염산염(비타민B₁₂)(USP) 100 mg

첨가제

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소,우유)

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 노랑(QX321A620000), 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈크, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 연한 황색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 비타민B₆ 및 B₁₂ 결핍으로 인한 신경계 질환

[용법·용량] 성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약에 함유되어 있는 비타민B₆가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있으므로, 레보도파와 병용투여(함께 복용(사용))하지 않는다.
- 3) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 수유부
- 4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 1) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 2) 두드러기, 발진, 가려움증 등의 피부과민반응이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약의 투여에 의하여 식욕부진, 복부팽만감, 구역, 구토, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 4) 고효율의 비타민B₆(1일 1g 이상)은 단기간 복용한 경우에도 신경독성을 유발할 수 있다.
 - 5) 이 약은 비타민B₆(피리독신)을 함유하고 있어 6개월 이상 복용 시 신경병증이 발생할 수 있다.
 - 6) 신생아와 영아(젖먹이)에서는 심한 진정, 저혈압 및 호흡기 장애(호흡 곤란, 무호흡)가 발생할 수 있다.
 - 7) 우발적으로 과량 복용한 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
 - 2) 피리독신 길항제(억제제)에 : 히드랄라진, 이소니아지드(INH), D-페니실라민, 시클로세린, 알코올 및 에스트로겐 함유 경구 피임약의 장기 사용은 비타민B₆ 결핍을 일으킬 수 있다.
 - 3) 5-플루오로우라실(5-FU)에 의해 티아민이 불활성화될 수 있다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 40정/상자(10정/PTP x 4), 80정/상자(10정/PTP x 4)x2, 100정/병

[사용기간] 제조일로부터 36개월

* 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

* 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

* 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

* 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

* 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

[소비자상담실] 080-708-8255

[제조자] 엔비케이제약(주) 충남 천안시 동남구 풍서로 539

[제조외의자] 진양제약(주) 강원도 원주시 지정면 신평로 34

[판매자] 보령컨슈머헬스케어(주) 서울 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

첨부문서 작성일자 : 2020.09.22 WK-1

제조자
NKB 엔비케이제약(주)

제조외의자
진양제약

판매자
보령컨슈머헬스케어