

시메타핀

효빠빠 위장약
위통 · 속쓰림 · 체함 · 구역
Cimetidine, Antacid Complex Ingredient

Cimetop Tab.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

· 유효성분 :	
시메티딘(KP).....	50mg
규산알루미늄산마그네슘(NF).....	100mg
(산화알루미늄으로서 30.65mg, 산화마그네슘으로서 24.1mg)	
히드로탈라이트(BP).....	125mg
(산화알루미늄으로서 21.25mg, 산화마그네슘으로서 50mg)	
탄산수소나트륨(KP).....	100mg
· 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 오파드라이	
현색(85F18422)	

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정제

[효능 · 효과] 위통, 속쓰림, 체함, 구역

[용법 · 용량]

성인(15세 이상 ~ 80세 미만) : 1회 2정씩 복용(사용)한다.
필요시 4시간 간격으로 1회 2정씩 1일 3회까지 복용(사용)할 수 있다.
단, 1일 3회(6정)를 초과하여 복용(사용)하지 말 것.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 다음 질환으로 치료를 받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장-간장질환, 위-십이지장질환, 천식, 루미티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다.)
- 3) 다음 약물을 복용(사용)하고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 이뇨제 항진균(곰팡이)제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다.)
- 4) 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액 이상의 병력이 있는 환자(혈구수 감소가 증가될 수 있다.)
- 5) 히스타민 H2-수용체 길항제(약제제)에 과민반응의 병력이 있는 사람
- 6) 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다), 80세 이상의 고령자(노인)에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(드러남)될 수 있다.
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 : 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 시메티딘은 모유 중 이행되므로 수유부가 복용(사용)할 경우에는 유의하지 않도록 주의한다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 위장약(작용이 강하게 발현(드러남)되어 예기치 못한 이상반응이 나타날 수 있다.)

3. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약의 복용(사용)에 의해 드물게 졸음, 어지럼, 혼란감이 생길 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 말 것.
- 2) 이 약을 복용(사용) 시에는 알콜음료를 섭취하지 말 것(혈중 알콜농도를 높일 수 있다.)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약물을 복용(사용)중인 사람 : 약물 상호작용에 의해 이상반응의 발현(드러남) 및 효과의 감소가 나타날 수 있다.
(1) 이 약에 함유된 시메티딘은 다음 약물들과 상호작용으로 이들의 배설을 지연시켜 약효가 강하게 나타날 수 있다 : 기관지확장제(테오필린 등), 혈액응고저해제(아로파린 등), 항진균(간질제(페니토인 등), 벤조다이아제핀계 약제(디아제팜, 트리악졸람 등), 삼환계항우울제(이미프린 등), 협심증-고혈압 치료제(베타-차단제 프로프라놀롤 등), 칼슘길항제(약제제)(니페디딘 등), 부장약치료제(메실레민 등), 마이크로아이드제 항생물질(테트라사이클린 등), 뉴-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
- (2) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다 : 테트라사이클린계 항생물질 및 뉴-퀴놀론계 항균제
- 2) 약물에 의한 과민반응의 병력이 있는 사람

- 3) 고령자(노인)(65세 이상) : 80세 미만의 고령자(노인)에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 복용(사용)한다.
- 4) 인후(목구멍)통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 이 약의 복용(사용)에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 이상반응을 은폐시킬 수 있다.
- 5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 6) 복통(배아픔)이 지속되는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 7) 신장병의 병력이 있는 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상담할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
(1) 복용(사용) 직후 두드러기, 부종(붓기), 가슴답답함과 동시에 안색창백, 수족냉증(손발이 차가움), 식은땀, 숨가쁨 등 이 나타나는 경우
- (2) 고열을 동반한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 열상(화상)의 수증 등의 심한 증상이 전신의 피부, 입, 눈의 점막에 나타나는 경우
- (3) 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(붓기))이 나타나는 경우
- (4) 변비, 설사, 두통, 발열, 권태감, 탈락감, 감기 증상, 하지(다려)-점막하출혈, 사지저림 및 굳은창, 두근거림, 황달, 전신부종(붓기), 혈뇨가 나타나는 경우
- 5) 3일간 복용(사용)하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 : 다른 질환이 있을 수 있다.

6. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 장기적으로 계속 복용(사용) 하지 말 것.
- 2) 2주상을 초과하여 계속 복용(사용)하지 말 것.
- 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 4) 과량 복용(사용)시에는 즉시 복용(사용)을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의할 것

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품은 원래 용기에서 깨내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 10정/피티파(10정/피티파)*1, 20정/피티파(10정/피티파*2), 120정/피티파(10정/피티파*12), 240정/피티파(120정/피티파*2)

[제조회사의 아이큐어] / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 248

[제조자] ㈜한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어와야 하며, 첨부문서는 항상 약함께 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (만약, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 소비자 상담전화(080-700-0178) 또는 의약품확인나라 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug>)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의사사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에서 할 수 있습니다.