

탈모 보조치료제

다모판텐정 100밀리그램 (덱스판테놀) Damopanten Tab. 100mg (Dexpanthenol)

【원료약품 및 그 분량】 1정(640mg) 중

- 유효성분: 덱스판테놀(USP) 100mg
- 첨가제(동등물유래성분) : 유당수화물 (기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제 : 글리세릴디베헤네이트, 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 흰색 또는 미황색의 원형 정제

【효능 · 효과】 탈모의 보조치료

【용법 · 용량】 성인: 1회 1정을 1일 3회 복용한다. 치료기간은 6주이다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 19세 미만 환자
- 3) 탈모증 이외의 사람
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 약물에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 피부: 홍진, 두드러기와 같은 피부 알레르기성 반응이 나타날 경우
- 2) 정해진 용법 · 용량대로 6주동안 사용하더라도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 약물의 상호작용을 피하기 위하여 최근 치료 상황을 의사나 약사에게 알릴 것.
- 3) 이 약의 복용으로 이상이 나타날 경우 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 25℃이하 보관

【포장단위】 60정(10정/PTPx6), 60정/병, 120정((10정/PTPx6)x2)

【제조번호】 용기에 별도표시

【사용기간】 제조일로부터 24 개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하신 경우 병 · 의원, 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최초작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.mcnultypharma.com) 또는 전화(031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(14-3330)

최초작성일자 : 2021.03.22
DMP-2103-00

제조외주자



충청남도 천안시 서북구
성환읍 울금3길 46

제조자



콜마제약
충청북도 제천시
바이오밸리2로 93