



【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분:	
벤토티딘(KP)(티아민염산염으로서 32.5 mg)	45 mg
비스벤티딘(KP)(티아민염산염으로서 4.4 mg)	5 mg
리보플라빈부타이레이트(KP)(리보플라빈으로서 5.7 mg)	10 mg
제피아스코르브산(별규)아스코르브산으로서 100.0 mg)	103.1 mg
니코틴아미드(KP)	10 mg
판토텐산칼슘(KP)	30 mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	10 mg
폴산(KP)	0.25 mg
산하이드라소(KP)(마그네슘으로서 60.3 mg)	100 mg
히드록스코발라민아세트산염(KP)(히드록스코발라민으로서 0.1 mg)	0.1 mg
인산시듐(KP)	10 mg
비오틴(USP)	0.05 mg
콜레칼시페롤충족말(EPI)(비타민D로서 1000.0 IU)(동물유래성분: 양, 양모)	10 mg
김마오자라는(KP)	5 mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민E로서 100.0 IU)	200 mg
산하이드라소(KP)(아연으로서 24.1 mg)	30 mg
우르소대우시콜산(KP)	10 mg
셀레늄함유진조충모(KP)(셀레늄으로서 12.5 µg)	23.15 mg
폴리타르타르산염(USP)	10 mg
시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 25.2 mg)	120 mg
레티놀팔미테이트과립(별규)(비타민A로서 2000.0 IU)	4 mg
베타-카로틴20%(별규)(베타카로틴으로서 0.4 mg)	2 mg
유비데카테논(KP)	10 mg
당개(KP)	10 mg
작약(KP)	10 mg
녹용50%에탄올유동엑스(별규)(동물유래성분: 순시슴, 뿔)	5 µg
황기(KP)	5 mg
로얄젤리(별규)(10-히드록시-2-데세노인산으로서 0.6 mg)	15 mg
첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 200 브라운(200F265005), 전분, 글리세린, 스테아르산, 라우린산, 코르스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스	

【성 상】 잔하 갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 배타인 A, D, E, B₁, B₂, B₃, C의 보금 - 유체피로 - 임신, 수유기 - 병중, 병후(병을 앓는 동안 이나 회복 후)의 재작당자 - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비티딘의 효과 - 호르몬에 민감하고, 본의 간조각의 완하 - 예방(방에 잘 못는 손잡) - 뼈 - 이의 발육을 촉진 - 구루병의 예방 - 미토콜로움과 잘 갖기 시 다음 중상의 인화: 근육-골격질, 수족발자-수족발자(손발이 차가움) - 다음 중상의 인화: 신경통, 근육통, 관절염(관절)로움 - 어깨결림, 두-간기 - 누의로움 2. 이의 보금

【유별·유량】 만 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고 1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 예외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 우유종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 영아 및 4) 신장(콩팥)결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용할 때 주의

1) انسان, 김숨, 경구, 테트라이클린제 제제, 재진제 2) 레보도파
4) 다음과 같은 사별(경유)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 및 1세 미만의 아이와 2) 의사의 처방을 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4)
고혈압을 앓는 환자 hyperoxaluria 1) 요로에 과량의 수산화물 비배출하는 상태 6) 알부민 함량이 높고 이를 기능성 8)
있는 여성, 수유, 미숙아, 유아 9) 외에서 발생한 3개월 미만 임신조기 9) 임신 초기 10,000 IU/L 미만 10) 10,000 IU/L 이상
선진형 여성으로부터 태어난 아이에서 두부진동 등 중독으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정되는 역
학조사결과 11) 오로인 3개월 이내 태어났고 이를 기능성 12) 여성에게 태아 A 결핍증조로 사용
하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 태어난 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 것은 위험
으로부터의 선형에 위약하고 이 약에 대한 태어난 A 투여는 5,000 IU/L 미만이며 머물도록 하는 적절한 주기를
한다. 9) 태어난 B는 무요로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 10) 소화장애, 만성적인 위장
근육신경대응 등의 위장질환 환자 3) 산성-순환기 기능 장애 환자 8) 신장(콩팥)에 환자 9) 저면혈색소 환자
10) 간성(콩팥)에 투여 중인 환자 11) 통풍 환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자 12) 신장(콩팥)결석 병력이 있는
환자 13) 일부

5. 다과고 같은 경우 이 약의 용량을 즉각 줄이거나 일시, 최후의 약사와 상의할 것. 삼담 시 가능한 한 침부 물로서 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 가친 피부, 청색선 관전소(부기), 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(발진에 의한 붉어짐), 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부)팽만감, 거, 저열, 열당알이오르, 삼복증상, 피부발진, 피부발진, 붉은 반점, 부전수상(심장박동증), 중추신경계 기능장애, 구역, 구토, 호흡기 이상, 담도 조영증, 위장관(장자)장애, 소화장애, 상부부(부)부종, 폐부(부)부기 2) 이 약의 투여에 의하여 생기기 예정보다 빨리나서 임의 정지할 필요성 있음, 출혈이 오지 않을 수 있음. 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 질환이 있는 환자나 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피마리돈을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 간기능장애 또는 신경병증(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 콜레스테롤 수치에 따라 비타민 B1을 1일 10 mg 이상 투여할 경우 열악한 척수신염증이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화 장애를 촉진시키거나 당내소화(당내장성) 손상(enzyme tolerance impairment: 신체의 효소능을 대하는 능력 장애), 고당혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대장투여에 의해 고혈압, 구토, 두드림, 위장장애, 고콜레스테롤, 울혈성부전, 부종(부) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 장기투여에 의해 고콜레스테롤을 결측으로 나타낼 수 있다. 10) 장기간 고용량의 비타민 A(비타에타이로로)부터 전현된 것을 제외한 성인은 폐기장을 치사(여성의 골다공증(骨喪症) 위험을 높일 수 있다. 11) 혈당(혈당)에 따라, 고혈당(혈당)과 병용투여 시 고콜레스테롤을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 12) 우발적으로 과량복용 한 경우 1) 기립성 저혈압 또는 중증의 가시인 경우

6. 7) 이 약의 투여 시 주의사항 1) 정해진 용량, 용량을 지킬 것. 2) 여자에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. 3) 복용시 음식, 한약, 약사, 한약사와 상의할 것. 4) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상인식(식)에 충분하 공급되므로 보충요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. 5) 각종 요양사(사)에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 6) 요를 환자에게 변화하여 임상진상치에 영향을 줄 수 있다. 7) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중 복용장애에 화할 수 있다.

7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 뒀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【사용기간】 제조일로부터 3년

● **의약품**은 인공적인 물질과/또는 발한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는
 다른 이상 증상은 구입한 통계를 통해 교환하여 드립니다.
 ● **제품**은 광장기(내장기)와 소시(보조기)를 결합한 제품으로, 정당한 소비사 피해에 대해 보상해 드립니다.
 ● **의약품**을 사용하실 때는 첨부서류를 주의 깊게 읽어주세요. 첨부서류는 의약품과 함께 보관하십시오.
 ● **자세한 사항은** 식품의약품안전처 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
 ● **문의**에 대해 문의 : **식약처의약품안전관리과**(1644-6223)

첨부분서 작성일 : 2022년 01월 11일

【판매원】(주)녹십자 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2로 588 T1F 080-280-0033