

게보린® 콜다운 정
오한 | 발열 | 인후통

GEWORIN® Cool down Tab.

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

유효성분 : 아세트아미노펜(KP)	400mg
벤조피타민(KP)	8mg
리보플라빈(KP)	4mg
제피어스크로브산(별첨)	103.10mg
(아스 크로브산으로서 100mg)	

첨가제 : 청색1호, 황색4호

기타 첨가제 : 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 QX복합제(3W610044), 오파드라이 클리어(03K19229), 저치 함도
히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

■ **성상** : 연한 초록색의 삼각형 필름코팅장

■ 효능·효과

2. 오한(出汗과 떨리는 증상), 발열시의 해열

■ 용법 · 용량

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회 1회 1정
공복(빈 속)시를 따하여 복용한다.
복용기간은 4시간 이상으로 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 검교

- 1) 매질 세포의 산성 환경으로부터 세포를 막는 데에는 사람이 이온이나 다른 핵염산 염류를 분해해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 산성성이 약의 복용량 유지에 영향을 미칠 수 있다.
- 2) 아세트아미노펜은 흡수된 후에서 대변으로 통과된 전신성 물질은 농도증가된 전신성 물질(신부전증) (AGEP), 스테로이드 - 복합 중화제(AGEP) 독성 피부 질환(AGEP)과 같은 증상을 피부 발진으로 보고되고, 이러한 증상은 피부 발진은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 증상은 다른 피부관용성 약제에 한하여 증상을 증폭시킬 수 있고, 이 약제 이후 피부 발진이나 다른 피부관용성 약제에 나타나는 즉시 복용을 중단해야 할 수 있다.
- 3) 이 약제에 대한 알레르기 반응은 아세트아미노펜을 포함한 약제와 함께 복용할 때 발생할 수 있다. 알레르기 반응은 아세트아미노펜을 포함한 다른 약제와 함께 복용하는 경우 인 것이다.

2. 다음과 같은 사람은 이 악을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용시 전식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(간-아기)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것

- 1) 수두 또는 유행성홍역에 감염되어 있거나 또는 의사의 권령에 따라 1년 또는 미만의 어린이(국외에서 수도를 순방하는 학생들 또는 변화가 있는) 드물지만 신체의 장해진 레파우송을 가진 사람, 특히 모든 의사의 권령 할 것
- 2) 만 3개월 이상 만 4세 미만의 영아에게 있는 의사의 권령을 받은 것을 우선으로 하며, 수두 및 다른 경우를 제외하고는 미용실이나 기타에서 바람직함
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 심복출수피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알러지 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 알러지 반응이 중대한 '발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증' 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 고혈압, 신장병, 심장병, 심장질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 특히 약한 사람 또는 고혈압 있는 사람
- 6) 고령자(노년)
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 약사 또는 치과의사와 치료를 받고 있는 사람(알레르기, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 복용 받고 있는 사람)
- 9) 속쓰림, 위장불쾌, 위통과 같은 위장장애가 지속 혹은 재발되거나, 특히 소화불량증에 가지고 있는 사람

*1) 이 약은 항색4호(디르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히
투여한다

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를
소지할 것.

- ① 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적종출증과 더불어 가려움, 구역, 구수, 식욕부진, 변비, 어지러움, 부종(부기)
- ② 이 약의 복용에 의해 독초와 배래의 중독상징인 홍창한 홍삼이 나타날 경우
- ③ 소아(어린이)에게 복통과 두드러기, 부종(부기), 가슴압박감과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식욕부진, 숨쉬기 곤란할 경우 나타날 수 있다.
- ④ 비특이적인 증상으로서 두드러기-손소양증, 단독 피부발진과 유사하여(단독 발진) 고열을 동반하고, 발진·발적종출증 없이 볼거리, 하살과 같이 물집이 생기는 등의 심한 홍삼이 전신으로 일어나는 증상에 나타날 수 있다.
- ⑤ 시력
- ⑥ 기가병에, 전신의 다른 한, 항문(항문) 또는 눈의 진자(진자) 한층씩 패들(패들) 나타날 수 있다.
- ⑦ ~6회 복용(복용) 후 즉시 출자(출자)하는 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용량·용량을 잘 지키기.
- 2) 장기간 계속 복용하지 않기.
- 3) 복용시에는 음주하지 않기.
- 4) 바르르하게 위를, 심지어 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시킬 수 있어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 뒹 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(일예하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 물건의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기 실온(1~30℃) 보관

■ 제조원 : 삼진제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제안공단1길 52

■ 포장단위 : 30섬/병

* 안전요기 개설킵법



① 병뚜껑을 위에서 아래로 힘껏 누른다.

② 뚜껑을 누른 상태에서 시계 반대방향으로 돌린다.

④ 도경을 연다.

- * 충분한 정보 제공과 함께 해결하십시오.
- * 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 제품의 사용기한은 제품포장재에 표시되어 있습니다.
- * 사용기한 전은 유효기간이 경과되었거나 변형·변질·오염되었거나 손상된 포장재를 이루고 있는 개체에 한하여 교환하여 드립니다.
- * 사용기한을 따지고 될 수 있는 한 출구가 적정 상태인 경우에만 교환이 가능합니다. 오장폐기물 보관소로 보내드립니다.
- * 물이 새거나 누출이 발생하였을 때에는 유해한 폐기물로 취급하여 폐기하십시오.
- * 본 제품에 대한 문의사항은 홈페이지 또는 고객센터를 통해 문의하십시오. 홈페이지: www.samsung.com 고객센터: 1522-3333
- * 소비자상담실(주식회사) 번호: 080-090-12345에 전화하시면 됩니다.
- * 약품을 사용 후, 포장재 및 사용 후 잔여의약품(폐기물)을 배출구에 배출하십시오.