

일반의약품

조제용

변비에 따른 증상의 완화

투비씬정

500정

【원료약품의 분량】 1정(685mg) 중

■ 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500mg, 우르소데옥시콜산(KP) 10mg, 노히엑스(EP) 100mg

■ 기타첨가제 : 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 폴리에틸렌글리콜400, 히프로멜로오스2910

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정

【효능 및 효과】 ● 변비 ● 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】 성인(15세이상) 1회 1정 1일 3회 식전(식간 또는 식후)에 복용한다. 다만, 초화는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다. 복용간격을 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것. 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화 될 수 있으므로 1주일 이

상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 500정/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제 조 자】 한국신텍스제약(주) / 전북 익산시 삼기면 산단오룡길 106

【판 매 자】 (주)나이스팜 / 서울특별시 강남구 영동대로 106길 17(삼성동, 경진빌딩) 4층

【소비자 상담실】 063-853-8110

【의약품정보참조】 <https://nedrug.mfds.go.kr>

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질 검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

KGMP 우수약품 지정업체



개정일 20201213

제조번호:

10×30mm

사용기한: