

뉴넥스정

복합적인 변비의 개선

1000정



한국신텍스제약(주)
KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL



QUIPUS C&C
키푸스 씨앤씨

【원료약품 및 그 분량】 1정(196.93mg) 중

■ 유효성분 : 비사코딜(KP) 5.00mg
티니벨리센나열매 가루(BP) 115.00mg
(히드록시안트라센글리코사이드(센노사이드B(으)로서 2.5mg))

■ 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호 ■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(KP)(소, 우유)

■ 기타첨가제 : 디아세틸레이티드모노글리세리드, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리에틸렌글리콜400, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스프탈레이트

【성상】 녹색의 원형 장용피장제 **【효능 및 효과】** 변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】 성인(만 15세 이상) : 1회 1-2정, 1일 1회 취침시에 복용한다. 다만, 초화는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자. 2) 장폐색(창자마힘) 환자. 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자. 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성. 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람. 4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람. 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우. 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우. 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우. 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진

용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다. 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것. 6. **저장상의 주의사항** 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 1000정/병 **【저장방법】** 기밀용기, 실온(1-30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

【제조사】 한국신텍스제약(주) / 전북 익산시 삼기면 산단오룡길 106

【판매자】 (주)키푸스씨앤씨 / 서울특별시 영등포구 경인로77길 49

【소비자상담실】 063-853-8110

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환하여 드립니다. ※ 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다. ※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)



KGMP 우수의약품 지정업체



HDPE
투명 : LDPE

제조번호 :

사용기한 :

40*20