

시원하게 녹여 먹는 목감기 치료제

콜콜[®] 트로키 모과맛

인후염
기침, 목감기
치료



일반의약품 | 분류번호 222

【원료약품 및 그 분량】 1트로키 중

- 유효성분: 에-페닐에페드린염산염(KP) 12.5 mg
노스카핀(KP) 10 mg
구아니딘골절산칼륨(USP) 45 mg
세틸메틸디니염화물수화물(USP) 1 mg
- 첨가제(타르산소): 황색4호(타르트라진) 알루미늄레이크
- 동물유래성분: 유당소, 우유
- 기타첨가제: 레몬맛분말(14215), 레몬향료, D-산니콜, L-멘톨, 모과향분말, 분당, 스테아르산마그네슘, 아세살람칼륨, 아스파탐, 이소말트, 페퍼민트, 포비돈

【효능 및 효과】

기침, 가래, 천식, 구내염(입안염), 변도염, 인 · 후두(목구멍)염으로 인한 목심 · 목의 불편감 · 인후(목구멍) 등 · 목이 부어오름

【용법 및 용량】

- 다음 복용량을 씹거나 삼키지 말고, 입안에서 천천히 녹여서 복용한다.
- 만 15세 이상 및 성인: 1회 1정씩 1일 6회, (복용간격 2시간이상)
 - 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만: 1회 1정씩 1일 4회, (복용간격 3시간이상)
 - 만 8세 이상 ~ 만 11세 미만: 1회 1정씩 1일 3회, (복용간격 4시간이상)

【성상】

미향(색연노랑)의 구멍이 뚫린 원형 트로키제

【사용상의 주의사항】

- 경고
1) 이 약에 함유되어 있는 인공감미료 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케토노증 환자에게 투여하지 말 것
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
1) 입부 또는 입안하고 있을 가능성이 있는 여성
2) 만 3개월 미만의 영아(간이아기)
3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
4) MAO제(제페람요독제, 항정신병제, 감성조절제, 항비탄산제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람)
5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당결핍 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
다른 진해기침을 그치게 한가급적(가래약), 감기약, 항스타틴제를 함유하는 내복약(비염)과(임용) 경구제, 말미라, 알레르기용약, 진정제

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
1) 빈인, 임신 또는 현재 또는 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 고열, 변두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 기러움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
3) 간질질환, 신장(중독)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자(노년), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
4) 수유부
5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
6) 다음과 같은 기증이 있는 사람
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
7) 편도선질환, 구강입만수술 후 7일 이내의 사람
8) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적(출혈)이 붉어짐, 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 어지러움, 물안, 떨림, 불면
2) 5 ~ 6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 전해질 균형 · 용량을 잘 지킬 것
2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
3) 만 7세 이하의 영(간이아기) · 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
4) 복용시에는 음주하지 말 것
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
2) 저서광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 차가워지도록, 실온(1~30℃) 보관

【수신처부담금격상임】 060-988-8888

【제조외의지】 조아제약(주)

경상남도 함안군 함안면 광성로 318
인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

【제조지】 경남제약(주)

충청남도 아산시 신항면 서부남로 790번길 49

- ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
- ※ 본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시기 바랍니다.
- ※ 의약품 용이성(명) 및 기타 자세한 약(의약품)정보는 약(의약품)안전나라(<https://hedug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 의사처치 받은 부작용이 나타나실 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국(의약품)안전나라(1664-6222)