

[원료약품의분량] 1정 중

• **유효성분** : 도큐세이트나트륨(USP) ... 12mg, 센나엽가루(생규) ... 55mg, 티니벨리센 나열매가루(히드록시안트라센글리코사이드(센노사이드B)(으)로서1.2mg)(BP) ... 55mg, 비사코딜(KP) ... 5mg • **첨가제(동물유래성분)** : 유당수화물(소, 우유) • **첨가제(타르색소)** : 청색1호, 황색4호 • **기타첨가제** : 글리세린모노스테아레이트, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수 전분, 폴리에틸렌글리콜6000, 피마자유, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스프탈레이트, 히프로멜로오스

[성상] 녹색의 원형 장용성 필름코팅정제

[효능·효과] 변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부 팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량] 보통 성인(15세이상) 1회 1~3정 1일 1회 취침시(공복시)에 복용한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색(창자막힘) 환자 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것. 1) 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 5) 직장출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐,

KGMP 우수약품 지정업체
일반의약품 분류번호: 238

조제용

생약+양약 복합처방의 시원한 변비약

비코원^정

500정

COSMAX PHARMA

가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우. 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우. 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 10세 이하의 소아에는 투여를 피하는 것이 바람직하다. 3) 반드시 필요한 경우 이외에는 만10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다. 4) 복용 시 정제를 씹지 말 것. 5) 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조의뢰자] 코스맥스파마(주) / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

[제 조 원] 한국신택스제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 106

[소비자상담실] 031-8018-0363

※ 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품 안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품부작용피해 구제상담 (한국의약품안전관리원 1644-6223)

BWTL1201030



HDPE
뚜껑: LDPE

제조번호:

사용기한:

40*20