

먹는 탈모 보조 치료제

케어모닉정 100mg

(덱스판테놀)

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분: 덱스판테놀(USP).....100.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제: 글리세릴디베히네이트, 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 폴로이드성 이산화규소, 크로스포비돈, 하이드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색 또는 미황색(연노랑)의 원형 정제

[효능·효과] 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인: 1회 1정을 1일 3회 복용한다.
치료기간은 6주이다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 19세 미만 환자
- 3) 탈모증 이외의 사람
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 약물에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 피부: 홍진, 두드러기와 같은 피부 알레르기성 반응이 나타날 경우
- 2) 경해진 용법·용량대로 6주동안 사용하더라도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 경해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 약물의 상호작용을 피하기 위하여 최근 치료 상황을 의사나 약사에게 알릴 것.
- 3) 이 약의 복용으로 이상이 나타날 경우 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 25℃이하 보관

[포장단위] 60정/상자(10정/PTP×6), 60정/병

[제품문의] ㈜더유제약 080-200-5724

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 혹은 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부 문서 작성(개정)일 이후 본 의약품의 최신 정보를 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[제조·의뢰자] ㈜더유제약 경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-151 1층, 2층

[제 조 자] 풀이파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

작성(개정)연월일 : 2020.11.23
M201101



The U Pharmaceuticals

(주)더유제약

경기도 남양주시 진접읍
경복대로바람골길 42-151