



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

효과 빠른 변비약 센스라유

일반의약품

KGMP

연질캡슐

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분

비사코딜(KP)	6mg
우르소데옥시콜산(JP)	12mg
도큐세이트나트륨(USP)	20mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호(브릴리안트블루FCF), 황색5호(산셋옐로우FCF), 황색203호(퀴놀린옐로우WS)
- 기타 첨가제 : 무수인산수소나트륨, 산화티탄, 소르비톨소르비탄 액, 시트산, 아자경화유, 젤라틴, 콩기름, 펙틴, 폴리소르베이트80, 황납

[성상]

미황색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능 · 효과]

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법 · 용량]

만 15세 이상 성인 : 1회 1캡슐씩 1일 2회 한도로 하여 되도록이면 공복시에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.


- (1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- (2) 장폐색(창자막힘) 환자
- (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- (2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- (3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- (4) 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람
- (5) 직장인 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- (6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- (7) 이 약은 황색5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.



4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- (2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
- (3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- (2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
- (3) 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- (4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- (3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위]

20 캡슐 / 상자(10캡슐 / PTP x 2)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 작성연월일(2021년 05월 07일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎ 14-3330, 1644-6223)

- ◆ 제조의뢰자 : **현대약품(주)**
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55
- ◆ 제조자 : **코스맥스파마(주)**
충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부
- ◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
사용설명서 작성연월일 2021년 05월 07일

