

부드럽고 효과적인 변비약

그린데이 플러스

창용연질캡슐

일반의약품
KGMP적격업체

[유효성분] 1캡슐(405 mg)

• 비사코딜(KP)	6.00 mg
• 우르소데옥시콜산(JP)	10.00 mg
• 도큐세이트나트륨(USP)	20.00 mg

[효능효과]

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[참가제]

- 착색제(타르색소): 황색5호, 황색203호, 청색1호
- 풍기를, 아자경화유, 황납, 폴리소르베이트80, 젤라틴, 소르비톨소르비탄액, 락틴, 무수인산수소나트륨, 시트르산, 산화티탄

[용법용량]

- 15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐씩 1일 1회 취침시(공복시) 복용한다.
- 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[상상]

미향색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

[포장단위]

20캡슐/상자(PTP X 2)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기간]

제조일로부터 24개월

[제조원]

코스맥스파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

[판매원]

(주)녹십자 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107(보정동)

[소비자상담실]

031-8018-0364 (반쯤 풀고 통화 : 구입처)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.

- 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

- 설명서 작성일자(2020년 11월 04일)이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템

(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 폐양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자막힘) 환자
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 4) 나트륨 제한식이음료 하고 있는 사람
- 5) 직장 의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한

이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발생 : 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
- 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.