

레모나 일공일사^정

【제품명】 레모나일공일사정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 아스코르브산97%과립(비타민C(아스코르브산)로서 1,000mg)(별규) 1,031mg
피리독신염산(KP) 10mg
리보플라빈(KP) 4mg
- 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMB노란색(90W22608), 오파드라이 흰색(20A680000), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 노란색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민C 보급: 육체피로, 임신, 수유기, 병중, 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능, 효과는 다음과 같다.
 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방

【용법·용량】

만 8세이상: 1일 1회 1정을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 5) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자

PP1404-K01

작성연월일: 2020.11.27

레모나 일공일사^정

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 식욕부진, 복부팽만감,
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다
- 4) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100정, 200정

【제조사】 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용 시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. PTP포장을 개봉하여 복용 시 기밀 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는 지 꼭 확인하시고 복용하십시오.
 3. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
소비자 상담전화: 080-232-8600, www.kyungnampharm.com
- ※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 “소비자분쟁해결기준”에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://nedrug.mfds.go.kr>」 → 의약품 등 검색, 을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223)