

일반의약품 정보

※ 이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위한 허가사항을 요약한 것으로 사용(복용) 전 반드시 첨부문서를 확인하십시오.
 ※ 부작용 보고 : 한국약물안전관리원 (1644-6223)

[유효성분] 1정 중

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
푸르셀티아민(KP)	60mg
나코틴산아미드(KP)	60mg
피리독신염산염(KP)	25mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
(칼슘으로서 1.2mg)	
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
r-오리자놀(KP)	5mg
시아노코발라민1000배산(KP)	20mg
(시아노코발라민으로서 20μg)	
이노시톨(KP)	20mg
클린타르타르산염(USP)	20mg

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기, 눈의 피로

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1회 1정, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염종결핵), 신장결핵 환자
 - 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 3) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 4) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 5) 신장결석 환자
 - 6) 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 심장·순환기계 기능 장애 환자
 - 4) 신장장애 환자
 - 5) 저당혈증 환자
 - 6) 감성비염제를 투여 중인 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 붉은 변, 설사, 구내염(입 안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진,

어지러움, 얼굴·다리 종창(부기) 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 5) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨 혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 7) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 8) 우발적으로 과량복용한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 용기 측면 표시일까지

[첨가제]

- 동물유래성분: 유당수화물(수, 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성 이산화규소, 탈필드갈색(S9B346), 탈필드흰색(19W623), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[제조사]  (주)시어스제약 (주)시어스제약/경기도 화성시 함남읍 발안공단로 32

[판매자]  보령컨슈머

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템(ndrug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
- ☎ 소비자상담실 (02)3487-7789

개정일자: 2021.05.03(00)

제조번호 :

사용기한 :

