

706-IS-00-210104

슬림더블정

(방통통성신건조엑스(4.6→1))

【원료물질 및 그 분량】 1정 중,

- 유효성분 : 방통통성신건조엑스(4.6→1)(궤구)..... 475mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호(알루미늄레이크), 황색203호(알루미늄레이크), 적색40호(알루미늄레이크)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산 마그네슘, 글로시달실리코나디옥사이드, 크로스카멜로소나트륨, 탭렛드주황색(790245), 포비돈

【성상】 주황색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

배에 피어(피부임) 자방이 없고 변비가 있는 환자의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어색결림, 흉조), 비만, 부기, 변비

【용법·용량】 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전(식전사때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 글란바 장기의 총괄작용에 의해 유·조산(조기발탄)의 위험이 있다.)
- 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황종 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 중 또는 말풍에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 다른 설사약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장증 또는 신장증(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감내(감내)하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 지시를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 6) 설사, 붉은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 7) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 붉은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 9) 병후의 약박기, 한자(한자) 체력이 쇠약해진 환자(이성분용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 10) 땅이 많이 나는 환자(과다한, 전신발열감 등이 나타날 수 있다.)
- 11) 열사증, 실금경색 등의 순환기에 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 12) 배뇨(소변)를 늦추는 환자(설사 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 13) 간장기능을 저하시키는 환자(설사 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 14) 지렁이(지렁이)에 의한 발진, 발진(출혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 15) 당뇨병 환자(마늘(메드론) 투여에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 우려가 있다.)
- 16) 이 약은 황색 5호(산성염료) FCF(Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 17) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 허혈성 등 지방대사 이상 환자 또는 지질상 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위압(도스태론) : 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 두꺼워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(일차 대황)이 감소되는 Ig 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 지혈불합중, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고장, 붓림), 부종(부기), 체중증가 등의 위압(도스태론)이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈압)증상의 속징을 중시하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - (2) 근병성(근육병증) : 지혈불합중의 결과로서 근병성(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 중시하고 주의할 것. 사지경직, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
 - (4) 피부 : 발진, 발진(출혈되어 붉어짐), 가려움 등이 나타나는 경우.
 - (5) 자율신경계 : 불면, 땅, 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신불안 등.
 - (6) 비뇨기계 : 배뇨(소변)를 늦추는 경우
 - (7) 간기능 장애 : ST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신)의 나쁜환, 황달(피부 또는 눈의 편자)가 황색을 띠게 될)가 나타날 수 있으므로 관찰이 중시되고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 2) 1개월 정도 변비가 복용하는 경우 1주일 정도 복용하여도 증상이 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것
- 2) 자극성 약제에는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 이 경우 매일 변비약이 필요한 상태라면 환원을 조사하여야 한다.
- 3) 정해진 용법, 용량을 잘 지킬 것. 대황의 사해작용은 개인차가 있으므로 용법, 용량에 주의할 것
- 4) 다른 한약제제 등과 병용(함께 복용(사용)) 투여할 경우 함유 성분의 중복에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 특히 주의할 것
- 5) 마늘 또는 메드론 함유제, MAO 억제제, 간장성제(테르코산, 리노치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계 제제(테오필린, 디프로필린)와 병용(함께 복용(사용)) 시 불면, 땅, 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신불안 등 증상이 나타나기 쉬우므로 감내하는 등 신중히 주의할 것
- 6) 지혈불합중, 간질유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(부루세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(테르클로로메타이드)와 병용(함께 복용(사용)) 시 위압(도스태론)이나 지혈불합중으로 인하여 근병성(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것
- 7) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(예)에 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방이 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 장중용 지질제를 동시에 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제에 혼합되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 약의 품질을 검토 할 때와 같이 다른 약과 비교하여 보관하는 것은 약의 품질 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 약물의 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【보존단위】 300정/병

【제조자】 코스맥스(파주) / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

【제조(외지)】 익수(제약주) 경기도 광주시 곤지암읍 독고길 38 / 02-416-1112~4 / www.ksu.co.kr

706-IS-00-210104

본 약품들은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변태 또는 소손된 제품이 발견될 경우 구입업체를 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁처리 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

- ※ 2021년 1월 04일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://medrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않습니다.
- ※ 사용 전 반드시 첨부서를 확인하고 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 투약중 보고 및 폐해구제 신청 : 한국약물안전관리과(1644-6223)
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국약물안전관리과(1644-6223)에 피해구제를 신청할 수 있습니다.