

- 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

* 고함량 벤포티아민 300mg

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분
 - 벤포티아민(KP) 300mg
 - 피리독신염산염(KP) 100mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에탄올, 정제수, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭실드노란색(21Y024), 멜크, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

연한 황색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

비타민 B₁ 및 B₆ 결핍으로 인한 신경계 질환

[용법·용량]

성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약에 함유되어 있는 비타민 B₆가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있으므로, 레보도파와 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

- 1) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 두드러기, 발진, 가려움증 등의 피부과민반응이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약의 투여에 의하여 식욕부진, 복부팽만감, 구역, 구토, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 고용량의 비타민 B₆(1일 1g 이상)은 단기간 복용한 경우에도 신경독성을 유발할 수 있다.
- 5) 이 약은 비타민 B₆(피리독신)을 함유하고 있어 6개월 이상 복용 시 신경병증이 발생할 수 있다.

- 6) 신생아와 영아(갓난아기)에서는 심한 진정, 저혈압 및 호흡기 장애(호흡 곤란, 무호흡)가 발생할 수 있다.

- 7) 우발적으로 과량 복용한 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
- 2) 피라독신 길항제(예 : 히드랄라진, 이소니아지드(INH), D-페니실라민, 시클로세린), 알코올 및 에스트로겐 함유 경구 피임약의 장기 사용은 비타민 B₆ 결핍을 일으킬 수 있다.
- 3) 5-플루오로우라실(5-FU)에 의해 티아민이 불활성화 될 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위]

60정/병, 120정/병(60정/병x2)

[저장방법]

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(홍열되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 작성연월일(2021년 08월 09일) 이후 변경된 내용은 현대약품㈜ 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎ 14-3330, 1644-6223)

◆ 제조의뢰자 : 현대약품(주)

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

◆ 제조자 : 한국코리서(주)

충청북도 제천시 강저로 30

◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979

사용설명서 작성연월일 2021년 08월 09일