



고함량 비타민B군, 항산화 성분으로 피로회복과 면역관리를 동시에! 임팩타민 프리미엄 원스

임팩타민 프리미엄 원스는 육체 피로와 활력 증강을 위한 고함량 활성 비타민B군 8종과 면역력 강화에 도움을 주는 항산화 성분인 비타민 C, E, 셀레늄과 아연, 그리고 비타민 D가 보강돼 하루 한 번 간편히 복용하는 프리미엄 제품입니다.

특 장 점

1. 피로회복에 도움을 주는 벤포티아민(B₁)을 고함량 함유
2. 체내 면역기능에 도움을 주는 비타민C, D, 아연 함유¹
3. 통증완화에 도움을 줄 수 있는 항산화 성분(비타민C, 비타민E, 셀레늄) 보강²

Ref. > 1. Silvia Maggini et al. Nutrients. 2018; 10:1531 1587. 2. Guo Hong Cai et al. Pain Physician. 2013;16:521 532.

효능·효과



육체피로
일리 부쩍 많아져
자도 자도 피로하신 분



신경통/관절통(어깨걸림)
목, 어깨가 뭉치고
걸리는 분



눈의피로
컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분



면역력 유지
활력이, 면역력 저하 증상으로
면역력 유지를 원하시는 분

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

■ 유효성분	
벤포티아민(비타민B ₁)(KP)(티아민염산염으로서 86.76mg)	120mg
리보플라빈(비타민B ₂)(KP)	50mg
니코틴산아미드(비타민B ₃)(KP)	50mg
판토텐산칼슘(비타민B ₅)(KP)	50mg
피리독신염산염(비타민B ₆)(KP)	50mg
시아노코발라민100배산(비타민B ₁₂)(별규)(시아노코발라민으로서 500μg)	50mg
비오틴(비타민B ₇)(SP)	0.25mg
폴산(비타민B ₉)(KP)	0.4mg
산화아연(KP)(아연으로서 24.1mg)	30mg
아스코르브산과립97%(별규)(아스코르브산으로서 250mg)	257.75mg
농축글라잔시페롤보알(EF)(비타민D ₃ 으로서 1000IU)	10mg
토코페롤아세테이트 50%(EF)(비타민E으로서 10IU)	20mg
셀레늄함유간조효소(KP)(셀레늄으로서 25μg)	25mg
우르소데옥시콜산(UP)	15mg
■ 기타 첨가제: 경질무수구산, 규산화미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카르멜로스나트륨, 크로스포비돈, 탭설드노란색(59Y628), 탭설드블루(92C069), 탭설드흰색(93W145), 하드록시프로필셀룰로오스	

효능·효과

1. 다음 경우의 비타민D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 1) 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시, 발육기, 노년기
- 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨걸림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 각기, 눈의피로

2. 아연의 보급

75

6

75

용법·용량 만 12세 이상 및 성인: **1일 1회, 1회 1정** 식후 복용하십시오.



※ 비타민B군의 함량이 높아 빈 속에 복용 시 일시적으로 속쓰림, 미식거림 등이 있을 수 있으니 식사 후 바로 복용하세요.

성상 미황색 내지 황색의 타원형 필름코팅정제

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 고칼혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고칼혈증 환자(hypercalcaemia: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 입부 및 입안과 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) (1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼혈증을 일으킬 수 있다.
 - 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 6) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 7) 신장질환 환자
 - 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 9) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발작증후(떨어 붙어짐), 묶은 번, 피부부, 땀·호흡기 인체, 탈모, 조경증, 위장장애, 소화장애, 상복부통증, 지혈안, 폐부종
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자(예)에 비타민 B₆를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 위장을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 9) 항알도스테로이드, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.
 - 2) 각종 요감사시에 혈액의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사자에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

포장단위 60정/병

※ 복용 후 뚜껑을 꼭 닫아주세요! (비타민은 온도/습도/열 등에 약하므로 서늘하고 건조한 곳에 보관해주세요)

사용기간 제조일로부터 24개월

- ※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.
 ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
 ※ 부작용보고 및 피해구제신청: 한국약약품안전관리원(1644-6223)

제조사: (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14



(주)대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일: 2020. 11. 16
최종 개정 연월일: 2021. 01. 28

※이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

H00 2300498