

고함량 비타민 B₁·B₆ 복합제

일반의약품

벤포커스정

고함량 활성 비타민 B 벤포티아민 함유

【성상】 연한 황색의 장방형 필름코팅정

【원료약품 및 그 분량】 1정(680밀리그램) 중 유효성분 :

벤포티아민(KP)	300 mg
피리독신염산염(KP)	100 mg

· 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

· 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 유당수화물, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭크, 탭셀드노란색(21Y024), 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】 비타민 B₁ 및 B₆ 결핍으로 인한 신경계 질환

【용법·용량】 성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약에 함유되어 있는 비타민 B₆가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있으므로, 레보도파와 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

- 1) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 두드러기, 발진, 가려움증 등의 피부과민반응이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약의 투여에 의하여 식욕부진, 복부팽만감, 구역, 구토, 묽은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 고용량의 비타민 B₆(1일 1g 이상)은 단기간 복용한 경우에도 신경독성을 유발할 수 있다.
- 5) 이 약은 비타민 B₆(피리독신)을 함유하고 있어 6개월 이상 복용 시 신경병증이 발생할 수 있다.
- 6) 신생아와 영아(갓난아기)에서는 심한 진정, 저혈압 및 호흡기 장애(호흡 곤란, 무호흡)가 발생할 수 있다.
- 7) 우발적으로 과량 복용한 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다.
- 2) 피리독신 길항제(억제제) (예 : 히드랄라진, 이소니아지드(INH), D-페니실라민, 시클로세린, 알코올 및 에스트로겐 함유 경구 피임약의 장기 사용은 비타민 B₆ 결핍을 일으킬 수 있다.
- 3) 5-플루오로우라실(5-FU)에 의해 티아민이 불활성화 될 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 뿔 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【포장단위】 60정/병, 120정(60정×2)/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【설명서 개정연월일 / 관리번호】 2020,12,03 / 2101-01

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 최종 개정연월일(2020,12,03)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해 구제신청 : 한국약물관리원(1644-6223)

【제조의뢰자】



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하길로 110
소비자상담실: 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실: 02-570-3888 홈페이지 www.ilmyang.co.kr

【제조사】



한국코러스

충청북도 제천시 감저로 30
www.Koruspharm.co.kr