



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

유린타민캡슐

전립선비대에 의한 배뇨장애

일반의약품

KGMP

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분
 - L-글루탐산(USP) 265mg
 - L-알라닌(USP) 100mg
 - 글리신(USP) 45mg
- 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호, 황색203호
- 기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 캡슐

[성상] 흰색 또는 미황색의 분말이 충전된 상부 적색 하부 황색의 경질캡슐제

[효능·효과] 전립선(전립샘)비대에 의한 배뇨(소변을 놓) 곤란·잔뇨 및 잔뇨감(소변을 누고난 후에도 다 놓 것 같지 않은 느낌)·빈뇨

[용법·용량] 성인 1회 2캡슐씩, 1일 3회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.

지금까지 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 일이 있는 사람.

2. 부작용

- 1) 소화기계 : 때때로 일과성(한번 나타나고 없어지는)의 위통, 가슴쓰림, 위부팽만감, 식욕부진, 구기(메스꺼움) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 2) 기타 : 때때로 일과성(한번 나타나고 없어지는)의 두통 등의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
- 2) 이 약은 전립선(전립샘)비대증의 근본적 치료제가 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)제이기 때문에 장기 연용(계속 복용)하는 경우에는 전립선(전립샘)비대증의 치료를 지연시키고 그 결과 요로감염증 등이 유발될 수 있으므로 주의하여 사용할 것.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[포장단위] 180캡슐(10캡슐/PTP x 18)
360캡슐((180캡슐(10캡슐/PTP x 18)) x 2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관



- ※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문약처로 문의하십시오.
- ※ 이 사용설명서 작성연월일(2020년 11월 18일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎ 1644-6223)

- ◆ **제조의뢰자 : 현대약품(주)**
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55
- ◆ **제조자 : (주)테라젠이텍스**
경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58
- ◆ **제품문의처 : ☎ 1666-9979**
작성연월일 2020년 11월 18일

