

고함량 활성 비타민제 찾으세요?

벤포테인정

Benfotein[®] tab.

KGMP전격업체 일반 의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 벤포타민(BK(P)).....300 mg
피리독신염산염(PK(P)).....100 mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(소의 유유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭탈도노란색(2Y024), 탭크, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 연한 황색의 장방형 필름코팅정

【효능 및 효과】 비타민 B6 및 B6 결핍으로 인한 신경계 질환

【용법 및 용량】 성인 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약에 함유되어 있는 비타민B6가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있으므로, 레보도파와 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것

- 1) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 두드러기, 발진, 가려움증 등의 피부과민반응이 나타나 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나지는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 이 약의 투여에 의하여 식욕부진, 복부팽만감, 구막, 구토, 땀은 변 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 고용량의 비타민 B6(1일 1g 이상)는 단기간 복용한 경우에도 신경독성을 유발할 수 있다.
- 5) 이 약은 비타민 B6(피리독신)을 함유하고 있어 6개월 이상 복용 시 신경병증이 발생할 수 있다.
- 6) 신생아와 영아(젖먹이)에서는 심한 진정, 저혈압 및 호흡기 장애(호흡 곤란, 무호흡)가 발생할 수 있다.
- 7) 우발적으로 과량 복용한 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 피리독신 결핍제(약제제) 예 : 히도랄라진, 이소니아지드(INH), D-페니실라민, 시클로세린, 알코올 및 에스트로겐 함유 경구 피임약의 장기 사용은 비타민 B6 결핍을 일으킬 수 있다.
- 3) 5-플루로우로우라실(5-FU)에 의해 티아민이 불활성화 될 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 불 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 말건하여(무명을 꼭 닫아) 보관한다.
- 3) 오·남용(오용 : 잘못 사용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다).

【포장단위】 30정 / PTP, 90정 / PTP

【저장방법】 기밀용기, 실온(15~30℃)보관

【제조회지】 조아제약(주) 인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12

공정 : 경상남도 함안군 함안면 공정로 318

【제 조 자】 한국코러스(주) 충청북도 제천시 강제로 30

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물안전관리원(1644-6223)

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

- ※ 본 약품들은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변해, 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.

개정연월일 : 2021. 01. 12 (Rev.0)